



Osmocote[®] Pro

Pro 5-6M

Helpt gewassen tot leven te laten komen

19 | 8 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	19%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	6.3%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.2%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	4.5%
P2O5	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.8%
K2O	Kaliumoxide	10%
	Wateroplosbaar (K2O)	10.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.01%
	Wateroplosbaar (B)	0.01%
Cu	Koper	0.037%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.023%
Fe	IJzer	0.30%
	IJzer EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangaan	0.04%
Mo	Molybdeen	0.015%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.010%
Zn	Zink	0.011%

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2.0-4.5 mm

Beschrijving

Neem de volledige controle over je voorjaarsbepotting met Osmocote[®] Pro 5-6M.

De formule is rijk aan NPK, magnesium en sporenelementen. Osmocote Pro is ontwikkeld voor een optimale groei van uw planten. Geniet van een langdurige aanvoer van voedingsstoffen gedurende een vooraf bepaalde periode van 5-6 maanden met de volledige coating, zodat je gerust kunt zijn over korte teeltcycli. Osmocote[®] Pro's unieke harscoatingtechnologie zorgt voor een uiterst regelmatig afgiftepatroon.

Voordelen

- Hoog gehalte aan sporenelementen
- Kan worden gecombineerd met in wateroplosbare meststof
- Goed geprijsd, veilig en gemakkelijk te gebruiken
- Milieuvriendelijk; met een CRF is er minder uitspoeling naar het milieu
- Consistent en uniform; Osmocote geeft dezelfde resultaten keer op keer

Hoe te gebruiken

- 1 Gebruik Osmocote® Pro voor een betrouwbaar, regelmatig afgiftepatroon dankzij de unieke ICL-harscoatingtechnologie.
- 2 Combineer Osmocote® Pro met wateroplosbare meststof en verlaag de aanbevolen hoeveelheden op het volgende tabblad, afhankelijk van de hoeveelheid wateroplosbare meststof die wordt gebruikt.
- 3 Gebruik Osmocote® Pro 5-6M voor het oppotten in het voorjaar.
- 4 De houdbaarheid van Osmocote® Pro 5-6M wordt beïnvloed door de temperatuur. (De werkingsduur van het product wordt bepaald bij 21°C) 16°C: 6-7 Mnd - 21°C: 5-6 Mnd - 26°C: 4-5 Mnd.
- 5 Zorg ervoor dat u gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed afsluit.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Neem contact op met een ICL adviseur als u meer informatie nodig hebt.

Doseringen

Dosering in gram/liter potinhoud	Lage voedingsbehoefte	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Containerboomkwekerij	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	4-4.5 g/l
Potplanten	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Perkplanten en eenjarige planten	2-3 g/l	3-4.5 g/l	4.5-5 g/l

Opgelet De aanbevolen hoeveelheden hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Dit product wordt niet aanbevolen voor dibbling en/of herfst/winter oppotten. Neem contact op met een ICL adviseur voor meer gedetailleerd advies. Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.