



Osmocote® Pro

Pro 12-14M

Gecoate meststof voor het hele jaar voeding

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	18%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	5.9%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	7.7%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	4.4%
P2O5	Fosforpentoxide	9%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.8%
K2O	Kaliumoxide	10%
	Wateroplosbaar (K2O)	10.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.018%
	Wateroplosbaar (B)	0.016%
Cu	Koper	0.045%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.035%
Fe	IJzer	0.35%
	IJzer EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangaan	0.049%
Mo	Molybdeen	0.017%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.017%
Zn	Zink	0.014%

Beschrijving

De perfecte keuze voor je oppotten. Je planten krijgen gedurende de hele teeltcyclus essentiële voeding door het regelmatige afgiftepatroon van onze unieke harscoating. Ze zullen bloeien met een hoge opname van NPK, magnesium en een verhoogd niveau van alle essentiële sporenelementen. Osmocote® Pro 12-14M is veilig, betrouwbaar en voordelig.

Voordelen

- Hoog NPK-gehalte, Mg en sporenelementen
- Harscoating voor een regelmatige afgifte gedurende de volledige gewascyclus
- Grote waarde, veilig en gemakkelijk te gebruiken

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2.0-4.5 mm

Hoe te gebruiken

- 1 Osmocote® Pro is ook ideaal in combinatie met wateroplosbare meststof, maar het is belangrijk om de hieronder vermelde toepassingsdoseringen te verlagen, afhankelijk van de hoeveelheid wateroplosbare meststof die wordt toegepast.
- 2 De levensduur van Osmocote® Pro 12-14M is afhankelijk van de temperatuur (de werkingsduur van het product wordt bepaald bij 21° C): 16° C: 15-17 Mnd - 21° C: 12-14 Mnd 26° C: 9-11 Mndn.
- 3 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 4 Droog bewaren.
- 5 Neem contact op met uw ICL adviseur als u meer informatie nodig hebt.

Doseringen

Dosering in gram/liter potinhoud	Lage voedingsbehoefte	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Containerboomkwekerij	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Opgelet De aanbevolen hoeveelheden hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Dit product wordt niet aanbevolen voor dibbling en/of herfst/winter oppotten. Neem contact op met uw ICL adviseur voor meer gedetailleerd advies. Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.