



Osmocote®
Exact
Standard

Standard 12-14M

Voor een gebalanceerde voeding met garantie op veiligheid, betrouwbaarheid en constante kwaliteit.

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Beschrijving

Osmocote® Exact Standard 12-14M is een uitzonderlijk veilig product voor teelten in pot. Naast gebruik op buitenvelden is het ook geschikt voor teelten in kassen en tunnels. Geschikt voor teelten met een teeltduur tot 12 à 14 maanden. Het gelijkmatige afgiftepatroon draagt bij aan een rustige en vitale gewasontwikkeling. Bovendien minimaliseert het verliezen. Door de unieke gele kleurcodering herken je de werkingsduur van 12-14 maanden.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	15%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	6.4%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.6%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	9%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6.5%



K ₂ O	Kaliumoxide	11%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	11%
MgO	Magnesiumoxide	2%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.023%
	Wateroplosbaar (B)	0.022%
Cu	Koper	0.06%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.047%
Fe	IJzer	0.45%
	IJzer EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangaan	0.064%
Mo	Molybdeen	0.023%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.023%
Zn	Zink	0.028%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.028%

Voordelen

- \\ Het hele jaar door gezonde, gevoede planten
- \\ Gecontroleerde afgifte en hoog niveau van alle essentiële sporenelementen
- \\ Consistent: elke zak geeft identieke resultaten
- \\ Een zeer gelijkmatig afgiftepatroon zorgt voor een gebalanceerd voedingsaanbod

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2.0-4.5 mm

Doseringen



Dosering in gram/liter potinhoud	Lage voedingsbehoefte	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Boomkwekerij & vaste planten in pot	4 - 4,5 g/l	5 - 5,5 g/l	6 g/l

****Aanbevolen doseringen voor Osmocote® Exact Standard in g/l potinhoud.**

Voor CNS herfstpotten adviseren wij om 2-3 g/l in de herfst toe te passen, gevolgd door 2-3 g/l Osmocote® Exact Standard 8-9M in de lente.

Opgelet

Doseringen zijn in gram/L potinhoud en gebaseerd op substraten bemest met maximaal 0,5 kg starmeststof /m³ potgrond (watermaat).

Doe altijd eerst een kleine proef, voordat er wijzigingen in de bemesting op grote schaal worden doorgevoerd. Vraag een ICL adviseur om een advies op maat. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor negatieve resultaten.

Hoe te gebruiken

- 1 De temperatuur beïnvloedt de werkingsduur van Osmocote® Exact Standard, bepaald bij 21°C. 16°C: 15-17 Mnd - 21°C: 12-14 Mnd - 26°C: 9-11 Mnd.
- 2 Sluit open, gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 3 Droog bewaren.
- 4 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

Doormengen door de potgrond is de aanbevolen doseermethode. Vraag een ICL adviseur naar mogelijkheden van plantgatdosering.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-12-14m/>
: 14/05/2024

ICL Growing Solutions Benelux

 ICL

