



Osmocote[®]
Exact
Standard

Lo.Start 16-18M

Geef langzaam groeiende gewassen het juiste voedingsaanbod.

15 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Beschrijving

Osmocote[®] Exact Lo.Start 16-18M geeft je jonge planten de juiste start en geeft tot 18 maanden voeding. Lo.Start is speciaal ontwikkeld voor langzaam groeiende en zoutgevoelige gewassen. Lo.Start 16-18M is ideaal voor situaties waarin een langzame start vereist is, zoals langzaam bewortelende planten en het vroeg oppotten in tunnels. Het is ook geschikt voor warme klimaten. Lo.Start 16-18M is de ideale precisievoedingsoplossing om langzame groeiers een goede start te geven.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	15%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	6.6%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.4%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6%



K ₂ O	Kaliumoxide	11%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	11%
MgO	Magnesiumoxide	2%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.02%
	Wateroplosbaar (B)	0.02%
Cu	Koper	0.05%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.031%
Fe	IJzer	0.45%
	IJzer EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangaan	0.06%
Mo	Molybdeen	0.02%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.014%
Zn	Zink	0.015%

Voordelen

- 🌱 Tot 18 maanden voeding voor traag groeiende gewassen.
- 🌱 Veilig: gecontroleerde afgifte en hoog niveau van alle essentiële sporenelementen
- 🌱 Consistent: elke zak geeft identieke resultaten
- 🌱 Afgestemd afgiftepatroon op de behoeften van uw gewas

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2.0-4.5 mm

Doseringen

Osmocote Exact Lo Start 16-18M is met name geschikt voor gewassen die een teeltduur hebben van 16 tot 18 maanden.

Doormengen door de potgrond is de aanbevolen doseermethode. Vraag een ICL adviseur naar mogelijkheden van plantgatdosering.



Dosering in gram/liter potinhoud	Lage voedingsbehoefte	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Boomkwekerij & vaste planten in pot	4-6 g/l	6-8 g/l	8-10 g/l
Potplanten	3-5 g/l	4-6 g/l	5-7 g/l
Perkgoed en éénjarigen	3-5 g/l	4-6 g/l	5-7 g/l

****Aanbevolen doseringen voor Osmocote® Exact Standard granulaat in g/L potinhoud**.**

Opgelet:

Doseringen zijn in gram/L potinhoud en gebaseerd op substraten bemest met maximaal 0,5 kg starmeststof /m3 potgrond (watermaat).

Let op:

Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Raadpleeg een [ICL adviseur](#) voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

Hoe te gebruiken

1

De temperatuur beïnvloedt de werkingsduur van Osmocote® Exact Lo.Start, bepaald bij 21°C. 16°C: 20-22 Mnd - 21°C: 16-18 Mnd - 26°C: 12-14 Mnd.

2

Sluit open, gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.

3 Droog bewaren.

4 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.



Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-lo-start-16-18m/>
: 13/05/2024