



Sierrablen[®] Plus

Active 3M

Actieve groei voor alle activiteiten

19 | 5 | 18 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	19%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	1.2%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	16.0%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	1.8%
P2O5	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P2O5)	4.8%
K2O	Kaliumoxide	18%
	Wateroplosbaar (K2O)	18%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
Cu	Koper	0.035%
Mn	Mangaan	0.14%
Zn	Zink	0.08%

Eigenschappen

Inhoud	25 kg zak
Korrelgrootte	1-2,5 mm
Werkingsduur	3 maanden

Beschrijving

Als je op zoek bent naar actieve groei, kies dan Sierrablen[®] Plus Active 3M. Deze meststof met een hoog stikstof- en kaliumgehalte is ideaal voor gebruik in het voor- en najaar. Met ICL's innovatieve coating profiteert uw gras van een gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 3 maanden. Helpt bij stressherstel en verbetert de algehele gezondheid van de plant dankzij het volledige sporenelementenpakket. Verhoog de kleur van je grasmat en verlicht stress dankzij het toegevoegde magnesiumgehalte. Sierrablen Plus Active 3M beschikt over Poly-S en PACE coating technologieën. Door de coating is SierrablenPlus absoluut veilig en er is geen risico op verbrandingsschade. In 2024 verkrijgbaar met de volledig biologisch afbreekbare eqo.s coating technologie.

Voordelen

- Uitgebalanceerde stikstof en kalium met toegevoegde fosaat
- Verbetert de kleur en algehele gezondheid van de grasmat
- Maskeert stresssymptomen en bevordert herstel van de grasmat

Hoe te gebruiken

- 1 Rechtstreeks op droog blad aanbrengen.
- 2 Water geven na het aanbrengen bevordert de verspreiding en versterkt het onmiddellijke effect.
- 3 Niet toepassen bij droogte of vorst.
- 4 Om beschadiging van de korrels te voorkomen, pas toepassen na voltooiing van beluchttingsprogramma's, inclusief verticuteren, insnijden en/of holle tunnels
- 5 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Voor meer informatie neem contact op met een ICL adviseur

Aanbevolen gebruiksperiode

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doseringen

Aanbevolen dosering: 25 – 35 g/m²

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.