



Sierrablen®

14-5-21+2MgO

Voor sterke, veerkrachtige graszoden

22 | 0 | 20
N P2O5 K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	22%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	22.0%
P2O5	Fosforpentoxide	0%
K2O	Kaliumoxide	20%
	Wateroplosbaar (K2O)	20.0%

Eigenschappen

Korrelgrootte 2-4,5 mm

Beschrijving

Sierrablen 14-5-21+2MgO is geschikt voor gebruik in de 2e helft van het groeiseizoen, maar kan waar nodig ook in het voorjaar toegepast worden. Het heeft genoeg gecontroleerd vrijkomende stikstof voor continue groei voor een periode van 4 tot 5 maanden. Het helpt de plant zich voor te bereiden op stressvolle condities. De stikstof wordt alleen vrijgegeven als de condities daarvoor goed zijn. Een kleine hoeveelheid stikstof is direct beschikbaar om te zorgen voor een onmiddellijke reactie, zelfs bij lagere temperaturen. Het product bevat daarnaast Magnesium om de kleur en gezondheid van het gras te vergroten. Sierrablen is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een gewone korrelgrootte. Het gras neemt de voedingsstoffen nagenoeg volledig op. Sierrablen 14-5-21+2MgO beschikt over de volledige biologisch afbreekbare eqo.s coating technologie.

Voordelen

- Verhoogd magnesium voor een uitstekende kleur en gezondheid
- 4-5 maanden werkingsduur
- Stikstof komt alleen vrij onder optimale groeiomstandigheden

Hoe te gebruiken

- 1 Direct toepassen op droog blad.
- 2 Na het aanbrengen water geven om de verspreiding te bevorderen en het onmiddellijke effect te versterken. Niet toepassen bij droogte of vorst.
- 3 Om beschadiging van de korrels te voorkomen, dient u het product toe te passen na voltooiing van een beluchtingsprogramma, inclusief verticuleren, insnijden en/of holle tunnels.
- 4 Bevat ijzer: Laat het product niet in contact komen met marmer, steen, stof, beton, zwembaden, enz. Omdat het product verkleuring kan veroorzaken, onmiddellijk afborstelen indien gemorst op beton, stoeptegels, kleding, enz
- 5 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Neem voor meer informatie contact op met uw technische ondersteuning.

Aanbevolen gebruiksperiode

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doseringen

Gemiddelde aanbevolen dosering:	32.5 g/m ²
Aanbevolen dosering:	25 - 40 g/m ²

Test eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.