



Osmocote[®] 5

8-9M

Voor een vroege start in het voorjaar

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	16%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	7.3%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	8.4%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.3%
P2O5	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.1%
K2O	Kaliumoxide	12%
	Wateroplosbaar (K2O)	12.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.2%
	Wateroplosbaar (MgO)	0.6%
B	Borium	0.01%
	Wateroplosbaar (B)	0.01%
Cu	Koper	0.018%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.018%
	Koper EDTA (Cu)	0.018%
Fe	IJzer	0.30%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.30%
	IJzer EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangaan	0.05%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.05%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molybdeen	0.010%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.010%
Zn	Zink	0.012%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.012%
	Zink EDTA (Zn)	0.012%

Beschrijving

Voorzie jouw planten van de juiste voedingsstoffen op het juiste moment met de gecontroleerd vrijkomende technologie van Osmocote[®] 5. Geef je planten een veilige en efficiënte voeding gedurende een periode van 8-9 maanden met de beste CRF met geprogrammeerde afgifte.

Voordelen

- \\ Voorzien van de NutriMatch-Release technologie voor een betere en preciezere afgifte van voedingsstoffen
- \\ Grote consistentie, alle zakken bevatten gelijke korrels
- \\ Meest efficiënte opname van voedingsstoffen

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2,0-4,5 mm

Hoe te gebruiken

- 1 Gebruik Osmocote® 5, 8-9M speciaal voor boomkwekerijgewassen, vaste planten en verschillende soorten potplanten.
- 2 Meng door het groeimedum voor een optimale korrelverdeling.
- 3 Je kunt Osmocote® 5 toepassen via plantgatdosering. Neem voor meer advies contact op met een ICL adviseur.
- 4 Als de Micromax Premium dosering hoger is dan 200 g/m³ groeimedum en wordt gecombineerd met Osmocote® 5, neem dan contact op met uw technisch adviseur van ICL voor gedetailleerd advies.
- 5 U kunt Osmocote® 5 combineren met Peters en Universol® wateroplosbare meststoffen. Neem voor specifieke aanbevelingen contact op met uw technisch adviseur van ICL.
- 6 De werkingsduur van Osmocote® 5 8-9M kan worden beïnvloed door de temperatuur. (De werkingsduur van het product wordt bepaald bij 21°C) 16°C: 10-11M 21°C: 8-9M 26°C: 6-7M.
- 7 Zorg ervoor dat je gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed afsluit.
- 8 Droog bewaren.

Doseringen

Doseringen in g/L potinhoud	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte	Minimale basis dosering bij gebruik van water oplosbare meststoffen
Kasteelt, boomkwekerij en vaste planten	3.5-4.5 g/l	4-4.5 g/l	2-3 g/l
Buitenteelt, boomkwekerij en vaste planten	4.5-5.5 g/l	5.5-6.5 g/l	3-4 g/l
Potplanten, perkgoed / eenjarigen	4.5-5.5 g/l	5.5-6.5 g/l	3-4 g/l

Belangrijk: De aanbevolen maximale dosering startmeststoffen in het groeimedium is 0,5 kg/m³. De doseringen voor Osmocote® 5 zijn gebaseerd op potinhoud. Bij verpotten in grotere potten moet het verdunningseffect worden gecompenseerd door de dosering in vers groeimedium te verhogen. De aanbevolen doseringen hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Dit product wordt niet aanbevolen voor dibbling en/of herfst/winter oppotten.

Let op: Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Raadpleeg een ICL adviseur voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.