



Sierrablen[®] Plus

Renovator 3M

De eerste keuze voor grasmatre Renovatie

20 | 20 | 8
N P2O5 K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	20%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	4.34%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	14.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.8%
P2O5	Fosforpentoxide	20%
	Wateroplosbaar (P2O5)	19.0%
K2O	Kaliumoxide	8%
	Wateroplosbaar (K2O)	8.0%

Eigenschappen

Inhoud	25 kg zak
Korrelgrootte	1-2,5 mm

Beschrijving

Deze speciaal samengestelde NPK-meststof bestaat uit minikorrels en wordt gebruikt om nieuwe graszoden te leggen of door te zaaien met een verbeterde gelijkmatige verdeling. Trakteer je gras op een gestage, gecontroleerde stikstofafgifte gedurende 3 maanden dankzij ICL's gepatenteerde Poly-S-coatingtechnologie en wissel die grasverbrandingssymptomen in voor perfecte, weelderig groene graszoden. Onder de oppervlakte zal je gras sterker wortelen dankzij de verhoogde fosfaatopname. In 2024 verkrijgbaar met de volledig biologisch afbreekbare eqo.s coating technologie.

Voordelen

- \\ Ideaal voor het leggen van nieuwe graszoden of doorzaaien
- \\ Snelgroeiend met een hoge grasdichtheid
- \\ Minimaliseert het risico op verbranding van jong gras

Hoe te gebruiken

- 1 Rechtstreeks op droog blad aanbrengen. Inwateren bevordert de verspreiding en versterkt het onmiddellijke effect.
- 2 Niet toepassen bij droogte of vorst.
- 3 Om beschadiging van de korrels te voorkomen, pas toepassen na voltooiing van beluchtingsprogramma's, inclusief verticuteren, insnijden en/of holle tunnels
- 4 Bevat ijzer.
- 5 Laat het product niet in contact komen met marmer, steen, stof, beton, zwembaden, enz. Omdat het product verkleuring kan veroorzaken, onmiddellijk afborstelen indien gemorst op beton, stoeptegels, kleding, enz.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 8 Voor meer informatie neem contact op met een ICL adviseur

Doseringen

Gemiddelde aanbevolen dosering:	30.00 g/m ²
Aanbevolen dosering:	25.00 – 35.00 g/m ²

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.