



AGROBLEN®

16-8-8+4,5CaO+2MgO+9SO₃

Najaarstoepassing op zachtfruit voor een goede start in het voorjaar

16 | 8 | 8 | 4,5 | 2,0 | 9
N P₂O₅ K₂O CaO MgO SO₃



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	16%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	7.3%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.7%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6.2%
K ₂ O	Kaliumoxide	8%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	8.0%
CaO	Calcium Oxide	4.5%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
SO ₃	Zwaveltrioxide	9%

Beschrijving

Als de lente is begonnen, zorg er dan voor de beste start met Agroblen® 16-8-8+4,5CaO+2MgO+9SO₃ | 8-9M. Deze NPK-meststof met een hoog stikstofgehalte is speciaal samengesteld om je te helpen bij aardbeien normaalcultuur. Met toegevoegd magnesium voor verbeterde fotosynthese is dit product ideaal voor toepassing in het najaar zodat het gewas er in het voorjaar profijt van heeft. Dankzij ICL's gepatenteerde Resin Release Technology kunnen je planten profiteren van een betrouwbare afgifte van 100% gecoate voedingsstoffen gedurende 8-9 maanden.

Voordelen

- \\ Een vaste, betrouwbare basisbemesting voor aardbeien in normaalcultuur
- \\ Kan vlak voor het planten in het plantgat worden aangebracht
- \\ Gelijkmatische gewasgroei dankzij geleidelijke afgifte van voedingsstoffen
- \\ Extra magnesium voor verbeterde fotosynthese
- \\ Extra calcium voor betere gewaskwaliteit

Hoe te gebruiken

- 1 Toepasbaar als plantgat- of rijenbemesting.
- 2 Niet meer dan 1-2 weken voor het planten toepassen.
- 3 In de grond verwerken op een diepte van 5-10 cm.
- 4 Plaats het product onder druppelaars waar van toepassing.
- 5 Verbeter de werking van het product en de plant door te irrigeren na de toepassing.
- 6 Verlaag de toegepaste dosering als WSF's worden gebruikt in het tweede deel van de gewascyclus.
- 7 Onder droge omstandigheden bewaren, sluit geopende zakken goed af.

Doseringen

Gewassen:

Aanbevolen dosering:

Wijngaarden en zacht fruit (aardbei, braam, framboos, aalbes) - nieuwe aanplant: 15-20 g/plant

Test eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.