

Enigma

Szybkie kiełkowanie i wyjątkowa siła siewek

Opis

Oto trawa wybitna we wszystkich aspektach. Niedawne badania NTEP (amerykańskiej organizacji zajmującej się oceną traw) wykazały, że Enigma należy do najlepszych odmian wiechlin łąkowych. Najszybciej kiełkowała, a jej siewki uzyskały najwyższe noty za żywotność, wzrost i ukorzenienie. To oznacza, że chwasty nie mają przy niej szans – zostaną błyskawicznie wyparte. Jej jakość, tak wysoko oceniona przez NTEP, i delikatna faktura pędów sprawiają, że doskonale się sprawdza w każdych warunkach. Jest też odporna na choroby i umożliwia wszechstronne zastosowanie. Jest idealna nie tylko do tworzenia dywanów trawnikowych, ale też do trawników, którym poświęca się mniej uwagi. Świetnie nadaje się również do renowacji muraw sportowych, ponieważ jest wystarczająco agresywna, aby konkurować z życią trwałą. Ma średnio intensywne zabarwienie i jest odporna na plamistość liści oraz rdzę żółtobłąwą, dobrze znosi deptanie i suszę. Idealnie nadaje się na boiska sportowe, do produkcji trawy z rolki i do trawników. Zachwyci Cię swoją umiejętnością szybkiego ukorzeniania i wzrostu. Znajduje się na liście STRI UK – wiodącej światowej organizacji zajmującej się doradztwem w sprawie trawnikowych nawierzchni sportowych.

Korzyści

- \\ Szybko kiełkuje, ukorzenia się i rozrasta
- \\ Dobrze znosi deptanie i suszę
- \\ Jest odporna na choroby

Sposób stosowania

- 1 Zakładanie i pielęgnacja trawnika: Najlepszy efekt osiąga się, wysiewając 10–15 g/m² wczesną jesienią lub wiosną. Najlepiej, aby podłoże było wilgotne w czasie fazy kiełkowania i ukorzeniania.
- 2 Kiełkowanie powinno zacząć się w ciągu 12–21 dni przy optymalnej temperaturze (12°C–24°C), a pokrycie całej powierzchni powinno nastąpić w ciągu 8–10 tygodni. Przed pierwszym koszeniem źdźbła powinny osiągnąć około 5 cm wysokości.
- 3 Wygląda najlepiej, jeśli jest corocznie nawożona azotem w dawce 15–20 g/m². Trawę najlepiej podlewać obficie i niezbyt często, a w razie braku opadów – lekko i często. Koszenie jest zalecane przy wysokości źdźbeł 12–50 mm.

Dawki

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.