



Agroleaf® Liquid

Magnesium

Płynne odżywanie roślin potrzebujących magnezu

7 | 0 | 0 | 10
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	7%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
MgO	Tlenek magnezu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	10.0%

Opis

Stworzony z myślą o odżywianiu magnezem, Agroleaf® Liquid Magnesium to wysokiej jakości płynny nawóz dolistny, opracowany do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. Agroleaf® Liquid Magnesium zawiera unikalną technologię F3 SurfActive, opracowaną przez ICL, która zwiększa efektywność każdej aplikacji dolistnej na trzy sposoby, zapewniając lepsze rozpraszanie, przyleganie i retencję. Technologia F3 obniża napięcie powierzchniowe kropli. Składniki odżywcze mogą być wtedy lepiej rozprószone po powierzchni liści, co skutkuje większym pokryciem oraz lepszym pobieraniem składników odżywczych. Mniej składników odżywczych będzie spływać lub odbijać się od woskowatych liści, co zapewni lepszą retencję składników odżywczych. Technologia F3 pomaga również w tworzeniu małych osadów składników odżywczych na powierzchni liści, które są ponownie aktywowane po ponownym zwilżeniu; zapobiega to parowaniu, co przedłuża okres odżywiania dla lepszej aplikacji dolistnej.

Korzyści

- \\ Doskonały do korygowania i zapobiegania niedoborom magnezu
- \\ Nadaje się do szerokiej gamy upraw
- \\ Lepsze rozpraszanie, przyleganie i retencja

Sposób stosowania

1

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecenia dotyczące upraw	Dawka litr/ha	Ilość wody litr/ha	Stęż. (%)	Czas
Warzywa ogólnie	3-6	300-600	1	W ciągu całego cyklu uprawy , 4-5 razy
Ziemniaki	3-6	250-300	1.2-2	Po kwitnieniu, 2-3 razy
Cebula, czosnek	3-6	300-600	1	Od 5-6 liści, 2-3 razy
Owoce miękkie, sady, winnice	3-6	600-1000	0.5-0.6	Zawiązanie owoców – zbiór , 3-4 razy
Zboża	3-6	200-300	1.5-2	2. międzywęźle – liść flagowy
Kukurydza	3-6	200-300	1.5-2	Przy 8-10 liściach
Rzepak	3-6	200-300	1.5-2	Od wiosny aż do kwitnienia

*Należy stosować niższe dawki przy mniejszej ilości wody/ha, a wyższe przy zwiększeniu ilości wody. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.