



Agroleaf[®] Liquid

Moly B

Twój płynny nawóz premium z borem i molibdenem

4 | 16 | 4
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	4%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.6%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	1.4%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	16%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	16%
K2O	Tlenek potasu	4%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	4%
B	Bor	0.1%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.1%
Mo	Molibden	2.00%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	2.00%

Opis

Agroleaf[®] Liquid Moly B to wysokiej jakości płynny nawóz dolistny z NPK, wzbogacony o bor i z wysoką zawartością molibdenu. Został opracowany dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na bor i molibden, będąc szybkim rozwiązaniem na wyrównanie ich niedoborów. Sekretem Agroleaf[®] Liquid Moly B jest technologia F3 SurfActive, którą zaprojektowaliśmy, by każda aplikacja dolistna była bardziej efektywna. Twoje uprawy korzystają z lepszego rozprowadzania, przylegania i retencji. Obniża napięcie powierzchniowe kropli, dzięki czemu składniki odżywcze mogą być lepiej rozprowadzone na liściach a to oznacza większe pokrycie i lepsze pobieranie składników odżywczych. Zatrzymuje więcej składników odżywczych, zapobiegając ich spływaniu lub odbijaniu się od woskowatych liści. F3 pomaga również składnikom odżywczym tworzyć małe osady na powierzchni liści, które są ponownie aktywowane po zwilżeniu, aby zapobiec parowaniu. Składniki odżywcze utrzymują się dłużej, co usprawnia aplikację dolistną.

Korzyści

- \\ Zapobiega niedoborom boru i molibdenu oraz koryguje je
- \\ Nadaje się do szerokiej gamy upraw
- \\ Lepsze rozprowadzanie, przyleganie i retencja

Sposób stosowania

1

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecenia dotyczące upraw	Dawka litr/ha	Ilość wody litr/ha	Stęż. (%)	Czas
Warzywa owocowe, ziemniaki	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2- 0.3	Podczas całego cyklu uprawowego, w przypadku upraw polowych, po zamknięciu rzędu
Rośliny strączkowe (soja)	1-2	300	0.3-0.7	Przy 6 liściach
Kapusta, kalafior, brokuły	1-3	300-600	0.3-0.5	Od 6-8 liści, 2-3 razy
Rzepak	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Jesienią, wiosną aż do kwitnienia, 2 razy
Słonecznik	1-3	200-300	0.5-1	Przy 4-6 liściach
Burak cukrowy	1-3	250-400	0.4-0.8	Przy 6-8 liściach
Rośliny pastewne	0.5-1	200-300	0.25-0.3	W ciągu całego cyklu uprawy , 2-3 razy

*Należy stosować niższe dawki przy mniejszej ilości wody/ha, a wyższe przy zwiększeniu ilości wody. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.