



Agromaster®

12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃

Utrzymuj swoje pola otwarte, aby uzyskać obfite plony

12 | 5 | 20 | 2 | 4.0 | 35
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO | SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	12%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	1.4%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	5.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.9%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Tlenek potasu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	20%
CaO	Tlenek wapnia	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	2%
MgO	Tlenek magnezu	4.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	35%

Opis

Daj swoim owocom i warzywom uprawianym na otwartym polu lub pod osłonami więcej mikroelementów dzięki Agromaster® 12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃ | 2-3M. Ta wysokopotasowa formuła NPK z dodatkiem wapnia, magnezu i siarki jest uzupełniona o 41% powlekanego N z technologią uwalniania ICL E-Max. Pozwala to na ochronę roślin o średnim cyklu uprawy przed utratą azotu w nawet najtrudniejszych warunkach pogodowych i uprawowych.

Korzyści

- Wysokopotasowa formuła NPK dla zwiększenia plonów
- Dodatek wapnia dla lepszego przechowywania i transportu
- Podwyższona zawartość magnezu dla lepszej fotosyntezy

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Poprawić wydajność produktu i roślin poprzez nawadnianie po zastosowaniu.
- 5 Zmniejszyć dawkę, jeśli WSF są stosowane w drugiej części cyklu uprawowego.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.

Dawki

Uprawy	Dawka
Warzywa uprawiane na obszarach chronionych lub na otwartych polach	
Pomidor, papryka i bakłażan	400-800 kg/ha
Ogórek, korniszon, cukinia, melon i arbuz	400-800 kg/ha
Cebula i czosnek	400-800 kg/ha
Marchew i inne warzywa korzeniowe	400-800 kg/ha
Sałata lodowa	400-800 kg/ha
Owoce miękkie uprawiane w glebie	
Truskawka	400-800 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.