



Agromaster®

12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃

Ulewny deszcz nie jest przeszkodą

12 | 12 | 22 | 3.7 | 2 | 13.5
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO | SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	12%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	4.5%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.5%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Tlenek potasu	22%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	22%
CaO	Tlenek wapnia	3.7%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	3.7%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	13.5%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	13.5%

Opis

Pomóż swoim uprawom ziemniaków, warzyw i owoców w glebie przetrwać najtrudniejsze warunki dzięki Agromaster® 12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃ | 2-3M. Dzięki klasycznej proporcji NPK 2-2-4 oraz dodatkowi wapnia, magnezu i siarki jest to idealne rozwiązanie, które zaspokaja wysokie zapotrzebowanie na potas w uprawach polowych i pod osłonami. Zapewnij swoim roślinom kontrolowane, niezawodne i trwałe 2-3 miesięczne uwalnianie azotu, nawet w najtrudniejszych środowiskach i warunkach, dzięki najnowszej technologii uwalniania ICL E-Max.

Korzyści

- \\ Idealne proporcje NPK dla większych plonów
- \\ Dodatek wapnia ułatwia transport i przechowywanie produktów końcowych
- \\ Zawiera dodatek magnezu dla lepszej fotosyntezy

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Poprawić wydajność produktu i roślin poprzez nawadnianie po zastosowaniu.
- 5 Zmniejszyć dawkę, jeśli WSF są stosowane w drugiej części cyklu uprawowego.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy	Dawki
Ziemniaki do przetwórstwa i spożycia	400-800 kg/ha
Warzywa uprawiane na obszarach chronionych lub na otwartych polach	
Pomidor, papryka i bakłażan	400-800 kg/ha
Ogórek, korniszon, cukinia, melon i arbuz	400-800 kg/ha
Cebula i czosnek	400-800 kg/ha
Marchew i inne warzywa korzeniowe	400-800 kg/ha
Sałata lodowa	400-800 kg/ha
Owoce miękkie uprawiane w glebie	
Truskawki	400-800 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.