



Sportsmaster® WSF

Spring & Summer

Mnóstwo dobrego dla wspaniałej trawy

28 | 5 | 19 | TE
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	28%
	Azot azotanowy (N-NO3)	5.6%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	1.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	21.4%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	5.0%
K2O	Tlenek potasu	19%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	19.0%
B	Bor	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.02%
Cu	Miedź	0.016%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.016%
	Miedź EDTA (Cu)	0.016%
Fe	Żelazo	0.13%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.13%
	Żelazo DTPA (Fe)	0.13%
Mn	Mangan	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.06%
	Mangan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molibden	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.016%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.016%
	Cynk EDTA (Zn)	0.016%

Opis

Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz odmieni Twoją murawę: specjalna technologia TMax ożywia liście i korzenie, aby lepiej wchłaniały składniki odżywcze, a duża ilość azotu oznacza, że na efekty nie trzeba długo czekać. Duża ilość potasu zapewnia stabilny wzrost i trwalszą murawę. Azot pochodzący z różnych źródeł (w tym znaczna ilość azotu mocznikowego) oznacza optymalne pobieranie składników odżywczych przez rośliny, a szereg mikroelementów zapewnia zdrowszą murawę. Produkt stanowi doskonałe uzupełnienie głównego nawozu granulowanego lub mieszanki zbiornikowej, gdy potrzebna jest większa ilość azotu. Nawóz można stosować od marca do sierpnia.

Korzyści

- Duża ilość azotu zapewnia szybki efekt i lepsze wchłanianie
- Zdrowsza, mocniejsza murawa o równomiernym wzroście
- Idealny dodatek do mieszanki zbiornikowej w celu optymalizacji poziomu azotu

Sposób stosowania

- 1 Można stosować od marca do października w zależności od warunków
- 2 Nawozy Sportsmaster® WSF można mieszać w zbiornikach z innymi produktami z tej serii, a także środkami zwilżającymi H2Pro® i H2Pro® Maximize.
- 3 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy. Wymieszać z barwnikiem Turf Mark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i zminimalizować rozprzestrzenianie się oprysku (Turf Mark® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BASF).
- 4 Aby mieć pewność, że produkt całkowicie się rozpuści, wymieszać, dodając wymaganą ilość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza, a następnie mieszać przez 10–15 minut. Napełnić zbiornik do pełna wodą. Temperatura wody wpływa na szybkość rozpuszczania.
- 5 W przypadku aplikacji dolistnych należy stosować małe ilości wody (300–600 l/ha), a dla optymalizacji pobierania składników odżywczych unikać wysokich temperatur i nasłonecznienia.
- 6 W przypadku aplikacji do korzeni należy stosować duże ilości wody (600–1000 l/ha) i bezpośrednio po zastosowaniu nawadniać przez co najmniej 2–3 minuty, aby zapewnić niezbędną ilość wody i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia murawy.
- 7 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.
- 8 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.



Dawki

Zalecana dawka: 15–60 kg/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

