



Greenmaster® Liquid

Spring & Summer

Wiosna i lato pełne miłości do trawy

14 | 5 | 7 | TE
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	14%
	Azot azotanowy (N-NO3)	0.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	13.1%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	5%
K2O	Tlenek potasu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	5.7%
B	Bor	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.012%
Cu	Miedź	0.006%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.006%
	Miedź EDTA (Cu)	0.006%
Mn	Mangan	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.012%
	Mangan EDTA (Mn)	0.012%
Mo	Molibden	0.004%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.004%
Zn	Cynk	0.006%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.006%
	Cynk EDTA (Zn)	0.006%

Opis

Idealny w podstawowych okresach wegetacji nawóz Greenmaster® Liquid Spring & Summer zawiera azot, fosfor i potas (NPK) gwarantujące odpowiednie odżywianie trawy bez powodowania jej nadmiernego wzrostu do 6 tygodni po zastosowaniu. Produkt uzupełnia również składniki odżywcze utracone w procesie koszenia i uwalnia żelazo w glebie, wydobywając głęboki kolor trawnika i utrzymując go w zdrowiu. Pełen zestaw mikroelementów gwarantuje dobrą kondycję murawy i pomaga jej przetrwać stres.

Korzyści

- Odżywianie w podstawowym okresie wegetacji bez powodowania nadmiernego wzrostu
- Odblokowywanie żelaza w glebie dla poprawy koloru i zdrowia
- Uzupełnienie składników odżywczych i lepsza regeneracja po stresie

Sposób stosowania

- 1 Stosować od kwietnia do września.
- 2 Unikać stosowania w wysokich temperaturach i przy dużym nasłonecznieniu, aby zoptymalizować pobieranie dolistne.
- 3 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 4 Nawozy Greenmaster® Liquid można mieszać w zbiorniku z innymi produktami z tej serii, z wyjątkiem Ca-Booster.
- 5 Można mieszać w zbiorniku ze środkami zwilżającymi H2Pro i H2Pro Maximize.
- 6 Wymieszać z barwnikiem TurfMark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i ograniczyć oprysk do pożądanego obszaru.
- 7 Ilość wody wpływa na sposób pobierania składników odżywczych przez roślinę.
- 8 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Zalecana dawka:

Średnia zalecana dawka:

40 - 120 L/ha

80 L/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

