



Nova Complex Optima

15-10-15+37SO₃+TE

Zapewnij swoim nawożonym uprawom zrównoważony dostęp do składników odżywczych.

15 | 10 | 15 | 37 | TE
N P₂O₅ K₂O SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	2.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	12.8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Tlenek potasu	15%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	15%
SO ₃	Trójtlenek siarki	37%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	37%
Fe	Żelazo	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.02%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.02%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Zn	Cynk	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.005%
	Cynk EDTA (Zn)	0.005%

Charakterystyka

Opis

Czasami lepiej jest zrezygnować ze złożoności i postawić na prostotę. Kiedy Twoje uprawy potrzebują zrównoważonej dawki składników odżywczych, wybierz po prostu nawóz Nova® Complex Optima 15-10-15+37SO₃+TE. Ta rozpuszczalna w wodzie, zrównoważona formuła NPK o obniżonej zawartości fosforu zawiera wysoki poziom dodatkowej siarki, która pokrywa wszystkie podstawowe potrzeby odżywcze Twoich upraw. Dzięki formule DMPP można zapomnieć o niedoborach i wypłukiwaniu azotu z gleby. A dodatkowy mangan, cynk i żelazo w postaci schelatowanych pierwiastków śladowych sprawi, że Twoje rośliny będą się cieszyć zrównoważonym, zdrowym wzrostem.

Korzyści

- \\ Ogranicza wypłukiwanie azotu z gleby
- \\ Przygotowany surowców wysokiej jakości
- \\ Całkowicie wolny od chlorków

Sposób stosowania

- 1 Stosować szczególnie w uprawach nawożonych poprzez fertygację. Aby uzyskać więcej zaleceń i informacji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem ICL lub lokalnym doradcą ICL w Twojej okolicy.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach. Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.

Dawki

Zalecane stężenie dla 1000 litrów roztworu podstawowego na polu: 100–150 kg / 100 l wody.

Dozuj wodę do nawadniania przy użyciu tego roztworu, dostosowując go do wymagań dotyczących przewodności lub proporcji upraw. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.