



Agroblen®

18-5-10+2MgO

Twoje truskawki zasługują na to, co najlepsze

18 | 5 | 10 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	18%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.4%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	2.0%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	3.7%
K2O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%

Opis

Uprawa najwyższej jakości truskawek i innych owoców owoców miękkich dzięki Agroblen® 18-5-10+2MgO | 2-3M. Nasycony azotem nawóz NPK z dodatkiem magnezu został opracowany specjalnie z myślą o uzyskaniu najlepszych rezultatów z uprawianych w gruncie truskawek, zwłaszcza tych, które zostały posadzone w sadzonkach „frigo”. Poprzez stosowanie metody rabatowej można zadbać o skuteczne nawożenie i szybkie zakładanie upraw. Ciesz się najbardziej owocnymi zbiorami dzięki kontrolowanemu uwalnianiu składników odżywczych z wykorzystaniem opatentowanej technologii ICL Resin Release Technology.

Korzyści

- Wysoka zawartość azotu, aby promować jednolity wzrost
- Dodatkowy magnez dla lepszej fotosyntezy
- Wystarczy jedna aplikacja, aby uzyskać odżywienie w całym krótkim cyklu uprawowym
- Zminimalizowane wypłukiwanie podczas opadów deszczu lub nawadniania

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rzędową lub przez rozsiewanie.
- 2 Nie stosować dłużej niż 1-2 tygodnie przed sadzeniem.
- 3 Umieścić w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 4 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 5 Poprawić wydajność produktu i roślin poprzez nawadnianie po zastosowaniu.
- 6 Zmniejszyć dawkę, jeśli WSF są stosowane w drugiej części cyklu uprawowego.
- 7 Przechowywać w suchych warunkach.
- 8 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 9 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.



Dawki

Uprawy:	Dawka
Truskawki – uprawy polowe prowadzone w glebie:	12-15 g/roślinę (przy 30 000 pl/ha)
Uprawy polowe na otwartym polu (w grządkach):	3-4 g/roślinę (przy 100 000 pl/ha)
Inne owoce miękkie – metoda rabatowa:	300-450 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.