



Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO₃

Pokażne plony niezależnie od pogody

19 | 5 | 20 | 4.0 | 19.5
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	19%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.4%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	17.6%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Tlenek potasu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	20.0%
MgO	Tlenek magnezu	4.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	19.5%

Opis

Agromaster® 19-5-20+4MgO+19.5SO₃ | 2-3M zawiera dużo azotu i potasu, dzięki czemu Twoje warzywa i owoce na pewno będą rosły równomiernie. Jest to idealne rozwiązanie dla upraw na polach otwartych lub obszarach chronionych, a także dla roślin w szkółkach polowych. Przyda się im dodatkowy magnez, który pobudza fotosyntezę oraz siarka, dzięki której mogą skuteczniej wchłaniać azot. Dzięki 35% powlekanemu azotowi z naszą nowoczesną technologią uwalniania E-Max, która umożliwia stopniowe uwalnianie azotu przez 2-3 miesiące, oraz mieszance konwencjonalnych nawozów, Twoje rośliny będą produkować więcej przy tych samych dawkach. Ogranicz straty: wypłukiwanie azotu, ulatnianie się i denitryfikacja są ograniczone do minimum, więc więcej trafia do upraw.

Korzyści

- Wysoki poziom NK dla równomiernego wzrostu, plus magnez i siarka
- Wyższe zbiory lub mniejsze zużycie przy zachowaniu zwykłej wydajności
- Mieszanka aktywnych mikroelementów i technologicznie kontrolowanego uwalniania

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić Agromaster® w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Nawadnianie po zastosowaniu poprawia wydajność produktu i roślin.
- 5 W przypadku stosowania WSF w drugiej części cyklu uprawowego, odpowiednio zmniejszyć dawkę Agromaster®.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy	Dawka
Szkółki upraw polowych	400-800 kg/ha
Owoce i warzywa uprawiane na obszarach chronionych lub na otwartych polach	400-800 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.