



Sportsmaster® WSF

High K

Mocniejsza trawa dzięki technologii TMax

15 | 0 | 43
N | P₂O₅ | K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	12.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	2.3%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	43%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	43.0%

Charakterystyka

Opis

Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz klasy premium doskonale przygotowuje trawę na stres, taki jak niskie temperatury lub zbliżająca się susza. Wykorzystuje opatentowaną technologię TMax, która zapewnia doskonałe przyswajanie składników odżywczych przez liście i korzenie. Preparat można łączyć z głównym nawozem granulowanym i stosować między majem a grudniem. Dzięki niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu wzmacnia murawę, jednocześnie zapobiegając jej zbyt szybkiemu wzrostowi. Chelatowane żelazo podkreśla kolor, a mocznik poprawia przyswajanie składników odżywczych przez liście.

Korzyści

- \\ Rozpuszczalna w wodzie odżywka uodparniającą trawę na stres
- \\ Odporniejsza murawa o doskonałym kolorze i łatwiejsze pobieranie składników odżywczych przez liście
- \\ Możliwość łączenia z głównym nawozem granulowanym

Sposób stosowania

- 1 Produkty Sportsmaster® WSF można mieszać w zbiornikach z innymi produktami z tej serii, a także środkami zwilżającymi H2Pro® i H2Pro® Maximize.
- 2 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 3 Wymieszać z barwnikiem Turf Mark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i ograniczyć oprysk do pożądanego obszaru (Turf Mark® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BASF).
- 4 Aby mieć pewność, że produkt całkowicie się rozpuści, wymieszać, dodając wymaganą ilość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza, a następnie mieszać przez 10–15 minut.
- 5 Napełnić zbiornik wodą do pełna. Temperatura wody wpływa na szybkość rozpuszczania.
- 6 Ilość wody wpływa na sposób pobierania składników odżywczych przez roślinę.
- 7 W przypadku aplikacji dolistnych należy stosować małe ilości wody (300–600 l/ha), a w celu optymalizacji pobierania składników odżywczych unikać wysokich temperatur i nasłonecznienia.
- 8 W przypadku aplikacji do korzeni należy stosować duże ilości wody (600–1000 l/ha) i bezpośrednio po zastosowaniu nawadniać przez co najmniej 2–3 minuty, aby zapewnić niezbędną ilość wody i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia murawy.
- 9 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływakimi.
- 10 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.



Dawki

Zalecana dawka: 15–60 kg/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

