



Sportsmaster® CRF Mini

Stress Control

Przygotuj murawę na zimę

10 | 6 | 21 | 7.0 | 2.0
N P₂O₅ K₂O CaO MgO

2-3

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	10%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	8.7%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5.7%
K ₂ O	Tlenek potasu	21%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	21.0%
CaO	Tlenek wapnia	7.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	6.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%

Opis

Dodaj nawóz do murawy, aby przygotować ją na stresy związane zimą oraz zapewnić jej zdrowy i piękny wygląd na wiosnę. Duża dawka potasu wzmocni ściany komórkowe i pomoże trawie skuteczniej regulować zasoby wody. Wysoka zawartość magnezu dodatkowo podkreśli jej intensywny kolor. Dzięki połączeniu natychmiastowego i wolniejszego, kontrolowanego uwalniania składników odżywczych, nawóz Sportsmaster® CRF Mini Stress Control będzie odżywiał murawę już od pierwszego dnia przez 2–3 miesiące, a zawarty w nim azot będzie dostępny tylko wtedy, gdy trawa będzie go potrzebować w okresie intensywnego wzrostu. W ten sposób przygotujesz murawę na chłodniejsze dni. Stosować od lipca do października. Dokładnie to, czego potrzeba, aby murawa była odporna na bardzo niskie temperatury i dobrze się rozwijała na wiosnę.

Korzyści

- Przygotowuje murawę na zimę i pomaga jej rosnąć wraz z nadejściem wiosny
- Mocniejsze ściany komórkowe, lepsza regulacja wody i intensywniejszy kolor
- Kontrolowane uwalnianie azotu przy jednoczesnym natychmiastowym odżywianiu

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suche żdźbła.
- 2 Podlanie po zastosowaniu nawozu pomoże w rozproszeniu granulek, da szybszy efekt początkowy i zminimalizuje ślady stóp.
- 3 Zaleca się stosowanie po procesach napowietrzania, takich jak wydrążanie, nacinanie i/lub wertykulacja, aby zapobiec uszkodzeniu granulek. Nie stosować w czasie mrozu lub suszy.
- 4 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia.
- 5 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Zalecana dawka: 20–35 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

