



Sportsmaster[®] CRF

High K

Przygotuj murawę na zimę dzięki nawozowi High K

16 | 6 | 26
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	16%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.5%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	14.5%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	4.5%
K2O	Tlenek potasu	26%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	26.0%

Opis

Bogaty w potas nawóz, który wzmacnia ściany komórkowe i zapewnia lepszą regulację wody. Doskonale przygotowuje on murawę na zimę i potencjalnie niskie temperatury. Wiosną gwarantuje wspianą, bujną trawę. Ten pomysłowy produkt o trwałości od 2 do 3 miesięcy uwalnia azot tylko w optymalnych warunkach do wzrostu, uodparniając rośliny na stres. Preparat High K łączy w sobie granulki wieloskładnikowe i granulki o kontrolowanym uwalnianiu składników. Wykorzystuje również otoczkowane technologie otoczkowania Poly-S i PACE. Granulki są częściowo nieotoczkowane, dzięki czemu murawa od razu odczuwa ich działanie.

Korzyści

- \\ Częściowa otoczka zapewnia natychmiastowy efekt i przedłużone uwalnianie
- \\ Dodatkowy potas wzmacnia ściany komórkowe i poprawia regulację wody
- \\ Idealne przygotowanie na zimę

Sposób stosowania

- 1 Stosować od marca do października, w zależności od warunków
- 2 Produkty Sportsmaster® WSF można mieszać w zbiorniku z innymi produktami ICL. Kompatybilność można sprawdzić w tabeli mieszania.
- 3 Aby upewnić się, że produkt całkowicie się rozpuści, należy go wymieszać, dodając wymaganą ilość do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do połowy wodą, a następnie mieszać przez 10-15 minut. Temperatura wody będzie miała wpływ na szybkość rozpuszczania.
- 4 Stosować na suche żdźbła.
- 5 Podlanie po zastosowaniu nawozu pomoże w rozproszeniu granulek, da szybszy efekt początkowy i zminimalizuje ślady stóp.
- 6 Zaleca się stosowanie po procesach napowietrzania, takich jak wydrążanie, nacinanie i/lub wertykulacja, aby zapobiec uszkodzeniu granulek. Nie stosować w czasie mrozu lub suszy.
- 7 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia.
- 8 Przechowywać w suchym miejscu.
- 9 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 10 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.



Dawki

Zalecana dawka: 20–30 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

