



ProTurf®

15-5-15+5CaO+2MgO

Podnosi odporność trawy

15 | 5 | 15 | 5.0 | 2.0
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO



Gwarantowana analiza

oxide		
N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	13.7%
	Azot organiczny	0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Tlenek potasu	15%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	15.0%
CaO	Tlenek wapnia	5.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	5.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%

Opis

Zbilansowana zawartość azotu i potasu w nawozie ProTurf zapewnia równomierny wzrost trawy i podniesienie jej odporności na niekorzystne czynniki środowiska. Zawartość magnezu zapewnia intensywne wybarwienie. Korzyści ze stosowania ProTurf 15-5-15+5CaO+2MgO to szybka reakcja trawy na nawożenie, a w dłuższej perspektywie, lepsza odporność na niekorzystne czynniki środowiska i żywe wybarwienie. Drobne, szybko zanikające, granulki nawozu ułatwiają równomierną aplikację na całej powierzchni. Dzięki stopniowemu uwalnianiu azotu, trawa jest dokarmiona przez ok. 2 miesiące.

Korzyści

- \\ Drobne granulki umożliwiają równomierną aplikację na całej powierzchni,
- \\ Zawartość magnezu zapewnia intensywne wybarwienie,
- \\ Szybka reakcja trawy na nawożenie i poprawa odporności na niekorzystne czynniki środowiska.

Sposób stosowania

- 1 Aplikować bezpośrednio na suchą trawę.
- 2 Podlanie po aplikacji pomaga w rozprowadzeniu nawozu i wzmacnia natychmiastowy efekt. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 3 Aby ograniczyć ryzyko powstawania odcisków stóp na trawniku, podlać po aplikacji. Zabiegi, takie jak aeracja (z wykorkami lub bez) i wertykulacja, powinny być przeprowadzone przed planowanym nawożeniem, aby uniknąć uszkodzenia granulek.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Zakres zalecanych dawek:	20,00–35,00 g/m ²
Przeciętna zalecana dawka:	27,5 g/m ²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.