



LALGUARD M52^{GR}

Lalguard M52

Lalguard M52 GR to skuteczny bioinsektycyd do zwalczania opuchlaka truskawkowca. Nie wymaga stosowania innych środków! Wysoka skuteczność, porównywalna z wieloma środkami chemicznymi. Łatwy w aplikacji, działa w podłożu przez wiele miesięcy od zastosowania.

Opis

Lalguard M52 to nowoczesny, biologiczny preparat owadobójczy, który jest odpowiedzią na potrzeby producentów roślin ozdobnych, pod osłonami i w uprawach polowych. Lalguard M52 jest dostępny w postaci granulatu w opakowaniach 1 kg i 10 kg. Preparat jest opracowany na bazie grzyba *Metarhizium brunneum* i przeznaczony do stosowania w podłożach do uprawy roślin ozdobnych i owoców miękkich. Charakteryzuje się wysoką skutecznością, porównywalną ze środkami chemicznymi. Bezpieczny dla pożytecznych organizmów glebowych. Łatwy w aplikacji, działa w podłożu przez wiele miesięcy od zastosowania.

Korzyści

- Skutecznie zwalcza opuchlaka truskawkowca i inne gatunki z rodzaju *Otiorhynchus*.
- Skuteczny bioinsektycyd nie wymagający stosowania innych środków w walce z opuchlakiem truskawkowcem.
- Wysoka skuteczność, porównywalna z wieloma środkami chemicznymi.
- Łatwy w aplikacji, działa w podłożu przez wiele miesięcy od zastosowania.
- Kompatybilny z konwencjonalnymi i organicznymi programami IPM.
- Bezpieczny dla pożytecznych makroorganizmów, uzupełnia działanie nicieni entomopatogenicznych (EPN).
- Wypełnia na rynku istniejącą lukę dostępnych środków do walki z opuchlakiem truskawkowcem.
- Brak okresu prewencji w uprawach roślin ozdobnych.
- Brak pozostałości / nie podlega MRL (Maximum Residue Limit – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości).
- Może być stosowany na każdym etapie procesu produkcyjnego roślin.

Sposób stosowania

Preparat dokładnie wymieszaj z podłożem przed sadzeniem. Zalecamy wymieszać najpierw z 1/3 podłoża, a następnie z resztą. Preparat może zostać również aplikowany przez producenta podłoża. Skontaktuj się z regionalnym doradcą techniczno-handlowym ICL w celu ustalenia rozwiązania najlepiej dopasowanego do Twoich upraw. Substraty uprawowe nie powinny być suche ani zbyt mokre (zwłaszcza te na bazie kory, aby nie dopuścić do przegrzania). Wykorzystaj zmieszane z preparatem podłoże w ciągu 30 dni. Optymalna temperatura wynosi 15–30°C (zarodniki przeżywają, jeśli ulegną zamrożeniu). Dane na temat skuteczności w cięższych typach gleb są ograniczone.

Dawki

Uprawy	Rodzaj produkcji	Metoda aplikacji	Termin stosowania	Dawkowanie	Okres karencji
Uprawy szkółkarskie, byliny	W pojemnikach	Wymieszać z podłożem przed doniczkowaniem	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	*0,5kg/m ³ (**150-300kg/ha)	Brak
Uprawy szkółkarskie, byliny	W gruncie	Wymieszać z wierzchnią warstwą gleby	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	12,5-25kg/ha	Brak
Kwiaty i rośliny ozdobne	W pojemnikach pod osłonami	Wymieszać z podłożem przed sadzeniem	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	*0,5kg/m ³ (**150-300kg/ha)	Brak
Kwiaty i rośliny ozdobne	W gruncie	Wymieszać z wierzchnią warstwą gleby	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	12,5-25kg/ha	Brak

Uprawy	Rodzaj produkcji	Metoda aplikacji	Termin stosowania	Dawkowanie	Okres karencji
Owoce miękkie: truskawki, maliny, jeżyny, agrest, porzeczki, jagody	W pojemnikach	Wymieszać z podłożem przed doniczkowaniem	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optimalna temp. 15-30°C)	*0,5kg/m ³ (**150-300kg/ha)	Nie stosować w dniu zbioru owoców
Owoce miękkie: truskawki, maliny, jeżyny, agrest, porzeczki, jagody	W gruncie	Wymieszać z wierzchnią warstwą gleby	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optimalna temp. 15-30°C)	12,5-25kg/ha	Nie stosować w dniu zbioru owoców

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych produktów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze skontaktować się z doradcą ICL.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.