



Osmocote[®] Bloom

Bloom 2-3M

Przyjazny dla środowiska nawóz dla kwitnących roślin rabatowych

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	13%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	5.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	6.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.9%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	18%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	18.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	20.7%
B	Bor	0.018%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.016%
Cu	Miedź	0.052%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.052%
Fe	Żelazo	0.35%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangan	0.050%
Mo	Molibden	0.017%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.012%
Zn	Cynk	0.021%

Opis

Osmocote Bloom jest opracowany specjalnie do roślin kwitnących, których cykl produkcyjny trwa nie dłużej niż 10-12 tygodni. Drobną granulacją umożliwia precyzyjne dawkowanie także w niewielkich pojemnikach (np. typu sześciopak). Niezbędne makro- i mikroelementy są dostępne dla roślin przez 2-3 miesiące od wykonania nawożenia. Formuła produktu została dostosowana specjalnie do potrzeb małych doniczkowych roślin jednorocznych – szybko zobaczysz korzyści, jakie płyną z jego stosowania. Odpowiednio dobrane proporcje azotu i potasu zapewniają zwarty pokrój i obfite kwitnienie. Wybierając nawóz do rzadszego stosowania, stawiasz na ekologiczne rozwiązanie, które jest bezpieczne, niezawodne i zdecydowanie warte swojej ceny.

Korzyści

- \\ Zawiera azot, fosfor i potas w optymalnych proporcjach 2:1:3, co zapewni zwarty pokrój roślin rabatowych
- \\ Gotowy do użycia, nie ma potrzeby dodawania nawozu rozpuszczalnego w wodzie
- \\ Przedłuża życie roślin w punktach handlowych i u odbiorcy końcowego

Sposób stosowania

- 1 Osmocote® Bloom do roślin rabatowych ma bardzo regularną krzywą uwalniania składników pokarmowych dzięki zastosowanej tu unikalnej technologii otoczkowania żywcowego, opracowanej przez ICL Specjalty Fertilizers.
- 2 Używaj Osmocote® Bloom do krótkotrwałych upraw rabatowych, trwających od 6 tygodni do 3 miesięcy.
- 3 Do innych rodzajów upraw rabatowych stosuj Osmocote® Exact Standard High K 3-4M lub 5-6M.
- 4 Nie przechowuj w temperaturze powyżej 21°C, ponieważ wpłynęłoby to negatywnie na czas działania Osmocote® Bloom. 16°C: 3–4 mies. 21°C: 2–3 mies. 26°C: 1,5–2 mies.
- 5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 6 Przechowywać w suchym miejscu.
- 7 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Rośliny rabatowe / jednoroczne	1.5-2 g/l	2-3 g/l	3-4.5 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, ziemia do sadzenia nie powinna zawierać nawozu startowego. Jeśli jednak nawóz startowy jest używany, zalecamy zastosowanie nie więcej niż 0,5 kg/m³ produktu i zgodnie z wymienionymi powyżej zalecanymi dawkami. Osmocote® Bloom jest przeznaczony przede wszystkim do mieszania z podłożem – nie zalecamy tego produktu do nawożenia punktowego wgłębnego. W określonych okolicznościach może być wymagane dodatkowe nawożenie nawozami rozpuszczalnymi w wodzie i/lub modyfikacje zależne od jakości wody. Skontaktuj się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady. Przed zmianą

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.