



Osmocote® Pro

Pro 3-4M

Nie uprawiaj zwyczajnie, tylko pro-fesjonalnie

17 | 11 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	17%
	Azot azotanowy (N-NO3)	6.6%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	9.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	1.4%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	8.2%
K2O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Mn	Mangan	0.04%
Mo	Molibden	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.011%

Opis

Wynieś wiosenne uprawy na wyższy poziom z Osmocote® Pro 3-4M. Jego bogaty w azot, fosfor i potas (NPK) skład opracowano z myślą o wszechstronnym wsparciu szybko rosnących roślin. Substancje pokarmowe dostarczane są w zależności od potrzeb rośliny, przez okres 3–4 miesięcy dzięki pełnemu otoczkowaniu nawozu, możesz więc nie martwić się o swoje uprawy o krótkim cyklu produkcji.

Korzyści

- \\ Bogaty w mikroelementy
- \\ Bezpieczny, godny zaufania i łatwy w użyciu
- \\ Niezwykle opłacalny

Sposób stosowania

- 1 Osmocote® Pro dostarcza w sposób kontrolowany substancje odżywcze dzięki unikalnej technologii otoczkowania żywicą opracowanej przez ICL.
- 2 Połącz Osmocote® Pro z nawozem rozpuszczalnym w wodzie.
- 3 Połącz Osmocote® Pro z nawozem rozpuszczalnym w wodzie.
- 4 Używaj Osmocote® Pro 3-4M do roślin o krótkim cyklu produkcyjnym oraz do sadzenia szybko rosnących roślin późną wiosną.
- 5 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 3-4M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 4–5 mies. 21°C: 3–4 mies. 26°C: 2–3 mies.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 7 Przechowywać w suchym miejscu.
- 8 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.



Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1.5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Rośliny doniczkowe	1.0-2 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l
Rośliny rabatowe / jednoroczne	1.5-2.5 g/l	2.5-3.5 g/l	3.5-4.5 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.