



Osmocote® Pro

Pro 5-6M

Pro-fesjonalnie pobudź swoje rośliny do życia

19 | 8 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	19%
	Azot azotanowy (N-NO3)	6.3%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	8.2%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.5%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	6.8%
K2O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.037%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.023%
Fe	Żelazo	0.30%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.04%
Mo	Molibden	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.011%

Opis

Przejmij pełną kontrolę nad wiosennym sadzeniem z pomocą Osmocote® Pro 5-6M. Jego bogata w azot, potas i fosfor (NPK), a także magnez i mikroelementy formuła została opracowana, by wszechstronnie wspierać wzrost Twoich roślin. Zapewnij sobie spokój ducha przez cały cykl uprawowy dzięki 100-procentowemu otoczkowaniu z żywicy, które pozwala dawkować substancje odżywcze przez 5 do 6 miesięcy, w zależności od potrzeb uprawianych roślin.

Korzyści

- \\ Charakteryzuje się wysokim poziomem mikroelementów
- \\ Może być łączony z nawozem rozpuszczalnym w wodzie
- \\ Bezpieczny, łatwy w użyciu, wart swojej ceny

Sposób stosowania

- 1 Użyj Osmocote® Pro, aby wykorzystać niezawodne uwalnianie składników odżywczych, które zapewnia unikalna technologia otoczkowania żywicą opracowana przez ICL.
- 2 Połącz Osmocote® Pro z nawozem rozpuszczalnym w wodzie, pamiętając o tym, aby obniżyć zalecane dawki, zależnie od ilości użytego płynnego nawozu.
- 3 Używaj Osmocote® Pro 5-6M do wiosennego sadzenia roślin w doniczkach.
- 4 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 5-6M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 6–7 mies. 21°C: 5–6 mies. 26°C: 4–5 mies.
- 5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 6 Przechowywać w suchym miejscu.
- 7 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	4-4.5 g/l
Rośliny doniczkowe	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Rośliny rabatowe / jednoroczne	2-3 g/l	3-4.5 g/l	4.5-5 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.