



Osmocote® Pro

Pro 8-9M

Zapewnij swoim roślinom wszystkie potrzebne składniki odżywcze przez cały cykl uprawowy

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	18%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	5.9%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.4%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.017%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.015%
Cu	Miedź	0.041%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.032%
Fe	Żelazo	0.33%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.046%
Mo	Molibden	0.016%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.016%
Zn	Cynk	0.020%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.013%

Opis

Ten w 100% otoczkowany nawóz jest szczególnie przydatny wiosną, ponieważ zawiera pełen zestaw składników odżywczych – azot, fosfor i potas (NPK), a także magnez i mikroelementy – potrzebne roślinom przez cały cykl uprawowy. Jest niezawodny, bezpieczny i wart swojej ceny. Jego skład obejmuje duże ilości NPK, aby dać Twoim roślinom to, co dla nich najlepsze. Użyta w Osmocote® Pro unikalna technologia otoczkowania z żywicy zapewnia niezwykle stabilne uwalnianie składników odżywczych

Korzyści

- Skład bogaty w azot, fosfor i potas (NPK) oraz pełną gamę mikroelementów
- Kontrolowane uwalnianie składników odżywczych: pokarm dostępny na cały okres uprawowy
- Bezpieczny, łatwy w użyciu i wart swojej ceny

Sposób stosowania

- 1 Osmocote® Pro doskonale się sprawdza w połączeniu z nawozem rozpuszczalnym w wodzie, ale trzeba pamiętać, aby obniżyć zalecane dawki, dostosowując je do ilości użytego płynnego nawozu.
- 2 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 8-9M (nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C): 16°C: 10–11 mies. 21°C: 8–9 mies. 26°C: 6–7 mies.
- 3 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 4 Przechowywać w suchym miejscu.
- 5 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	3–3,5 g/l	3,5–4,5 g/l	4,5–5,5 g/l
Rośliny doniczkowe	3–4 g/l	4–5 g/l	5–6 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Pamiętaj, że są to zalecenia ogólne – różne warunki uprawy, na przykład panujące w tunelach, szklarniach lub określonym klimacie, wymagają modyfikacji dawek. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.