



Osmocote[®] Pro

Pro 12-14M

Najlepsze rozwiązanie do doniczkowych nasadzeń jesienią i wiosną

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	18%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	5.9%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.4%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.018%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.016%
Cu	Miedź	0.045%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.035%
Fe	Żelazo	0.35%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangan	0.049%
Mo	Molibden	0.017%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.017%
Zn	Cynk	0.014%

Opis

Produkt idealny do sadzenia w doniczkach wiosną i jesienią. Dzięki naszej unikalnej otoczce z żywicy niezbędne dla rozwoju roślin składniki odżywcze będą uwalniane w kontrolowany sposób przez cały cykl produkcyjny. Rośliny będą świetnie się rozwijać dzięki dużej zawartości azotu, fosforu i potasu (NPK) oraz magnezu, a także dzięki podwyższonemu stężeniu wszystkich najważniejszych mikroelementów. Osmocote[®] Pro 12-14M jest bezpieczny, niezawodny i wart swojej ceny.

Korzyści

- \\ Bogaty w azot, fosfor i potas (NPK), a także w magnez i mikroelementy
- \\ Otoczka z żywicy zapewnia regularne uwalnianie składników odżywczych przez cały cykl uprawy
- \\ Bezpieczny, łatwy w użyciu i wart swojej ceny

Sposób stosowania

- 1 Osmocote® Pro doskonale się sprawdza w połączeniu z nawozem rozpuszczalnym w wodzie, ale trzeba pamiętać, aby obniżyć zalecane dawki, dostosowując je do ilości użytego płynnego nawozu.
- 2 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 12-14M (nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C): 16°C: 15–17 mies. 21°C: 12–14 mies. 26°C: 9–11 mies.
- 3 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 4 Przechowywać w suchym miejscu.
- 5 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szklarskie	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Pamiętaj, że są to zalecenia ogólne – różne warunki uprawy, na przykład panujące w tunelach, szklarniach lub określonym klimacie, wymagają modyfikacji dawek. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.