



Osmocote[®]
Exact
Protect

Protect 8-9M

Optymalne uwalnianie składników pokarmowych dla Twoich upraw szkółkarskich przez 8 do 9 miesięcy

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	14%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.02%
Cu	Miedź	0.045%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.028%
Fe	Żelazo	0.42%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molibden	0.020%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.014%
Zn	Cynk	0.015%

Opis

Osmocote Exact Protect 8-9M jest nawozem o kontrolowanym uwalnianiu składników przeznaczonym do jesienno/zimowego sadzenia w doniczkach oraz do upraw wrażliwych na zasolenie podłoża. Przy zastosowaniu pełnej dawki dodatkowym atutem jest brak konieczności ponownego nawożenia wiosną. To duże udogodnienie, które docenisz szczególnie w okresach największej sprzedaży. Osmocote[®] Exact Protect 8-9M można mieszać z podłożem lub stosować punktowo wgłębnie. Stosowanie wgłębne jest zalecane tylko w przypadku dobrze ukorzenionych sadzonek (P9). Korzystaj tylko z takich dozowników do nawozu, które nie powodują uszkodzeń otoczki.

Korzyści

- \\ Idealny do jesienno/zimowego sadzenia w doniczkach i do roślin wrażliwych, nieco dłuższy okres uwalniania składników pokarmowych niż w przypadku Osmocote[®] Exact Protect 5-6M
- \\ Zapewnia bujniejszy wzrost dzięki opóźnionemu uwalnianiu składników
- \\ Oszczędza czas i nakłady pracy w okresach największej sprzedaży

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Protect, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 10–11 mies. 21°C: 8–9 mies. 26°C: 6–7 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1,5–2 g/l	2–3 g/l	3–5 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Protect w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Protect Suma = 15 g/pojemnik Powyższe dawki są zalecane do podłoży, w których zastosowano maksymalnie 0,5 kg/m³ nawozu bazowego. Zalecenia mają charakter ogólny. W przypadku większości sadzonek nie ma konieczności stosowania nawozu bazowego. Aby uzyskać indywidualne wskazówki, a także rady dotyczące dawek w połączeniu z PlantTrust, skontaktuj się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Osmocote® Exact Protect to nawóz w 100% podwójnie otoczkowany. Uwalnianie składników odżywczych jest opóźnione i rozpoczyna się 1,5 do 2 miesięcy po aplikacji. To bardzo ważne, aby zastosować Osmocote® Exact Protect we właściwym okresie sadzenia. Zależnie od okoliczności konieczne może być dodatkowe nawożenie w niewielkich ilościach w głównym okresie wegetacji. Skontaktuj się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers, aby uzyskać indywidualne wskazówki. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.