



Osmocote[®]
Exact
Protect

Protect 12-14M

Całoroczne odżywanie wrażliwych upraw w szkółkach

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	14%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.8%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	6.0%
K2O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.02%
Cu	Miedź	0.045%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.028%
Fe	Żelazo	0.42%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molibden	0.020%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.014%
Zn	Cynk	0.015%

Opis

Dzięki zaprogramowanemu uwalnianiu składników Osmocote[®] Exact Protect 12-14M doskonale nadaje się do sadzenia w doniczkach od połowy października do połowy stycznia oraz do upraw wrażliwych na zasolenie podłoża. Nawóz może być stosowany w produkcji pojemnikowej roślin iglastych i liściastych, w tym róż (także sadzonych z balotem). Jeśli zaaplikujesz pełną dawkę, nie będzie już konieczne ponowne nawożenie na wiosnę. Zaoszczędzony czas przyda się szczególnie w sezonie sprzedażowym. Osmocote[®] Exact Protect 12-14M można mieszać z podłożem lub stosować punktowo wgłębnie. Stosowanie wgłębne jest zalecane tylko w przypadku dobrze ukorzenionych sadzonek (P9). Korzystaj tylko z takich dozowników do nawozu, które nie powodują uszkodzeń otoczki.

Korzyści

- Optymalna dostępność składników odżywczych przez cały rok
- Zapewnia bujniejszy wzrost dzięki opóźnionemu uwalnianiu składników
- Oszczędza czas i nakłady pracy w okresach największej sprzedaży

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Protect, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 15–17 mies. 21°C: 12–14 mies. 26°C: 9–11 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Protect w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Protect Suma = 15 g/pojemnik Powyższe dawki są zalecane do podłoży, w których zastosowano maksymalnie 0,5 kg/m³ nawozu bazowego. Zalecenia mają charakter ogólny. W przypadku większości sadzonek nie ma konieczności stosowania nawozu bazowego. Aby mieć pewność, że rośliny dostaną wystarczającą ilość pokarmu na wiosnę, dawka powinna wynieść od 3 do 6 kg/m³ (zależnie od uprawianego gatunku). Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Osmocote® Exact Protect to nawóz w 100% podwójnie otoczony. Uwalnianie składników odżywczych jest opóźnione i rozpoczyna się 1,5 do 2 miesięcy po aplikacji. To bardzo ważne, aby zastosować Osmocote® Exact Protect we właściwym okresie sadzenia. Zależnie od okoliczności konieczne może być dodatkowe nawożenie w niewielkich ilościach w lecie. Skontaktuj się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers, aby uzyskać indywidualne wskazówki. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.