



Sierraform[®] GT

Momentum

Niech murawa rośnie jeszcze lepiej

22 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	22%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	4.0%
K2O	Tlenek potasu	11.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
Cu	Miedź	0.02%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.100%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.020%

Opis

Wszystkie składniki odżywcze, których może potrzebować Twój trawnik, znalazły się w jednym nawozie. Wieloskładnikowe mikrogranulki, które łatwo równomiernie rozprowadzić, są pokryte naszymi opatentowanymi otoczkami MU2 i Silk. Momentum zawiera azot, fosfor i potas (NPK) w łagodnej dla trawy proporcji 4:1:2, przy czym azot i potas występują zarówno w standardowej postaci, jak i w formie o opóźnionym uwalnianiu. Dzięki temu trawnik otrzymuje składniki odżywcze nawet przez 6–8 tygodni. Produkt zawiera także magnez, który poprawia wybarwienie trawy, oraz mikroelementy, które utrzymują ją w optymalnym stanie. Nawóz nadaje się do każdego obszaru z delikatną darnią i jest szczególnie przydatny wiosną i latem, w czasie najintensywniejszego wzrostu trawy.

Korzyści

- \\ Poprawia jakość trawy w sezonie wegetacyjnym
- \\ Łatwo się rozprowadza
- \\ Systematycznie uwalnia składniki odżywcze przez 6–8 tygodni

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suchą trawę i podlać po 1–2 dniach w razie braku opadów. Podlanie pomaga rozprowadzić nawóz i zmniejsza ryzyko zebrania go przez kosiarkę z nisko koszonej trawy. Podlanie po aplikacji ogranicza ryzyko powstania odcisków stóp na trawie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 2 Nie stosować wertykulacji i/lub innych zabiegów pielęgnacyjnych przez 3 dni od nawożenia, aby nie zaburzyć rozprowadzenia granulek. W temperaturze poniżej 10° C uwalnia się znacznie mniej azotu.
- 3 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dawki

Zalecana dawka: 20 – 30 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.