



Sierraform[®] GT

Anti-Stress

Bez stresu

15 | 0 | 26 | 1
N P₂O₅ K₂O Fe

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	15%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.2%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	7.8%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	0%
K2O	Tlenek potasu	26%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	26.0%
Fe	Żelazo	1.00%

Opis

Jeśli wiesz, że Twój trawnik będzie narażony na działanie czynników stresogennych, posyp go zawczasu Sierraform[®] GT Anti-Stress i pomóż mu poradzić sobie ze niekorzystnymi warunkami oraz utrzymać piękny wygląd. Dodatkowa dawka potasu uodporni trawę na wszelkie niedogodności. Nawóz doskonale sprawdza się latem i jesienią na obszarach z delikatną darnią. Zawiera nie tylko azot i potas uwalniane w standardowy sposób, ale też dawki tych pierwiastków uwalniane z opóźnieniem, dzięki czemu efekt utrzymuje się przez 6–8 tygodni i nie następuje gwałtowny wzrost. Zawarte w nawozie żelazo zapewnia piękne wybarwienie trawy. Nie musisz się też martwić nagromadzeniem fosforu w glebie, ponieważ nie ma go w składzie. Wieloskładnikowe mikrogranulki stworzyliśmy z wykorzystaniem naszych specjalnych opatentowanych technologii otoczkowania MU2 i SiLK.

Korzyści

- \\ Jest doskonałą odżywką przygotowującą na trudne warunki
- \\ Zawiera azot i potas w standardowej postaci oraz w formie uwalnianej z opóźnieniem
- \\ Poprawia wybarwienie i hartuje trawę

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suchą trawę i podlać po 1–2 dniach w razie braku opadów. Podlanie pomaga rozprowadzić nawóz i zmniejsza ryzyko zebrania go przez kosiarkę z nisko koszonej trawy.
- 2 Podlanie po aplikacji ogranicza ryzyko powstania odcisków stóp na trawie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 3 Nie stosować wertykulacji i/lub innych zabiegów pielęgnacyjnych przez 3 dni od nawożenia, aby nie zaburzyć rozprowadzenia granulek. W temperaturze poniżej 10° C uwalnia się znacznie mniej azotu.
- 4 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.
- 5 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dawki

Zalecana dawka: 20 – 30 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

