



Sierraform[®] GT

All Season

Zdrowszy i pełen koloru trawnik

18 | 6 | 18 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	18%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	8.2%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	5.0%
K2O	Tlenek potasu	18%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	18.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
Cu	Miedź	0.02%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.100%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.020%

Opis

Jeśli Twojemu trawnikowi daleko do doskonałości, gdyż był narażony na działanie czynników stresogennych, sięgnij po Sierraform[®] GT All Season. Trawa już w ciągu kilku dni zacznie się regenerować. Nawóz zawiera azot, fosfor i potas (NPK) uwalniane w konwencjonalny sposób oraz azot i potas uwalniane z opóźnieniem oraz, pełną gamę mikroelementów, które wspomagają zdrowie trawnika, a także magnez, który poprawia wybarwienie murawy. Nawóz można stosować po zabiegu aeracji, aby pobudzić wzrost trawy. Jednolite mikrogranulki stworzyliśmy z wykorzystaniem naszych specjalnych, opatentowanych technologii otoczkowania MU2 i SiLK. Sierraform[®] GT All Season uwalnia składniki odżywcze przez 6–8 tygodni przy niższych temperaturach. Jest doskonałym wyborem na czas od wiosny do jesieni, zwłaszcza na obszarach z delikatną darnią.

Korzyści

- \\ Pomaga trawnikowi zregenerować się po działaniu czynników stresogennych i odzyskać zdrowie
- \\ Ma wyważony skład obejmujący azot, fosfor, potas (NPK), a także magnez i niezbędne mikroelementy
- \\ Poprawia wybarwienie i stymuluje wzrost trawy

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suchą trawę i podlać po 1–2 dniach w razie braku opadów. Podlanie pomaga rozprościć nawóz i zmniejsza ryzyko zebrania go przez kosiarkę z nisko koszonej trawy. Podlanie po aplikacji ogranicza ryzyko powstania odcisków stóp na trawie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 2 Nie stosować wertykulacji i/lub innych zabiegów pielęgnacyjnych przez 3 dni od nawożenia, aby nie zaburzyć rozproszczenia granulek. W temperaturze poniżej 10° C uwalnia się znacznie mniej azotu.
- 3 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dawki

Zalecana dawka: 20 – 30 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.