



ProTurf®

21-5-6+2.5CaO+2.5MgO

Spraw, aby Twój trawnik nabrał życia na wiosnę

21 | 5 | 6 | 7.0 | 2.5
N P2O5 K2O CaO MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	21%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	1.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	19.7%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	4.7%
K2O	Tlenek potasu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	6.0%
CaO	Tlenek wapnia	7.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	5.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.5%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%

Opis

Ożyw swój trawnik po długich zimowych miesiącach. Pomoże Ci w tym nawóz o opóźnionym uwalnianiu składników odżywczych ProTurf® 21-5-6+2.5CaO+2.5MgO. Produkt łączy w sobie zalety zarówno technologii kontrolowanego uwalniania, jak i wieloskładnikowych nawozów, jest bogaty w azot i polihalit. Wzmocnij odporność swojego trawnika na warunki atmosferyczne, popraw jego wybarwienie i zadbaj o jego zdrowie. Wszystko to osiągniesz dzięki dużym ilościom potasu, magnezu, siarki i wapnia zawartych w nawozie. Czas, aby Twój uśpiony trawnik przebudził się i nabrał kolorów wraz z nastaniem wiosny.

Korzyści

- \\ Drobne granulki równomiernie pokryte otoczką zapewniają intensywniejsze działanie
- \\ Nawóz gwarantuje kontrolowany wzrost i szybki efekt zazielenienia
- \\ Wysoce rozpuszczalne niewielkie granulki nie przeszkadzają osobom korzystającym z trawnikowej nawierzchni

Sposób stosowania

- 1 Aplikować bezpośrednio na suchą trawę.
- 2 Podlanie po aplikacji pomaga w rozprowadzeniu nawozu i wzmacnia natychmiastowy efekt. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 3 Aby ograniczyć ryzyko powstawania odcisków stóp na trawniku, podlać po aplikacji. Zabiegi, takie jak aeracja (z wykorkami lub bez) i wertykulacja, powinny być przeprowadzone przed planowanym nawożeniem, aby uniknąć uszkodzenia granulek.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dawki

Zakres zalecanych dawek:	20,00–35,00 g/m ²
--------------------------	------------------------------

Przeciętna zalecana dawka:	27,5 g/m ²
----------------------------	-----------------------

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.