



Sierrablen®

22-0-20

Na takiej trawie aż chce się grać

22 | 0 | 20
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	22%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	22.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	20.0%

Opis

Sierrablen® 22-0-20 zagwarantuje Ci radość z gry na najpiękniejszych polach golfowych. Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych, bogaty w azot i potas, utrzyma Twój trawnik w dobrej formie przez okres 4–5 miesięcy, między wiosną a jesienią. Wolno uwalniany azot dostaje się do gleby wyłącznie przy określonych, optymalnych warunkach uprawy, dzięki czemu trawnik jest hartowany przed surowymi zimowymi miesiącami. Niewielka ilość azotu dostępnego dla roślin od razu po aplikacji wywołuje natychmiastową reakcję trawnika.

Korzyści

- \\ Doskonale nadaje się do hartowania roślin przed nastaniem niekorzystnych warunków
- \\ Nawóz uwalnia składniki odżywcze w kontrolowany sposób przez okres 4–5 miesięcy
- \\ Niewielka ilość azotu jest dostępna dla roślin już na starcie, co wywoła szybką reakcję trawnika

Sposób stosowania

- 1 Aplikować bezpośrednio na suchą trawę.
- 2 Podlanie po aplikacji pomaga w rozprowadzeniu nawozu i przyspiesza jego działanie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 3 Zabiegi, takie jak aeracja (z wykorkami lub bez), skaryfikacja i wertykulacja, powinny być przeprowadzone przed planowanym nawożeniem, aby uniknąć uszkodzenia granulek.
- 4 Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi. Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia.
- 5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 6 Przechowywać w suchym miejscu.
- 7 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dawki

Przeciętna zalecana dawka:	37,5 g/m ²
----------------------------	-----------------------

Zalecana dawka:	30,00–45,00 g/m ²
-----------------	------------------------------

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

