



Agroleaf[®] Power

High K

Ogranicz skutki działania stresów abiotycznych
dostarczając roślinom potas

15 | 10 | 31 | TE
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	9.0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.3%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	10.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	31%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	31.0%
B	Bor	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.03%
Cu	Miedź	0.070%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.070%
	Miedź EDTA (Cu)	0.070%
Fe	Żelazo	0.16%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.16%
	Żelazo DTPA (Fe)	0.16%
Mn	Mangan	0.07%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.07%
	Mangan EDTA (Mn)	0.07%
Mo	Molibden	0.0012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.0012%
Zn	Cynk	0.070%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.070%
	Cynk EDTA (Zn)	0.070%

Charakterystyka

Opis

Agroleaf[®] Power High K to najwyższej jakości, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny, który koryguje i zapobiega niedoborom potasu i innych składników. Wspiera wczesne dojrzewanie, poprawia kolor, zwiększa zawartość cukru i odporność owoców. High K sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach, w których rośliny mają problemy z pobieraniem wody z korzeni, takich jak zimna, deszczowa pogoda i wysokie pH gleby. Skomponowany z najczystszych, podstawowych składników Agroleaf[®] Power High K wywoła spektakularną przemianę upraw. Produkt jest w pełni rozpuszczalny, więc nie trzeba się martwić o zatykanie instalacji opryskowych. A ze względu na wysokie stężenie do zastosowania wystarcza niewielka ilość preparatu, więc High K zdziała znacznie więcej niż myślisz.

Korzyści

- \\ Koryguje i zapobiega niedoborom potasu i innych różnych składników
- \\ Pobudza wczesne dojrzewanie i lepsze wybarwienie owoców
- \\ Podwyższa zawartość cukru w owocach i poprawia odporność upraw.

Sposób stosowania

- 1 Stosować pod wysokim ciśnieniem.
- 2 Może być mieszany z wieloma fungicydami/insektycydami. Zapytaj dystrybutora o szczegółowe informacje.
- 3 W przypadku wszystkich mieszanek ze związkami chemicznymi, przed użyciem na dużą skalę należy wykonać małą próbę. Sprawdzić reakcję w ciągu 2-3 dni.
- 4 Unikać oprysków w okresach niekorzystnych warunków (np. silne nasłonecznienie, wysokie temperatury w południe, okresy intensywnego parowania).
- 5 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Do zastosowań zewnętrznych rozpuścić 3-5 kg w 200-1000 litrów wody na hektar.

Do stosowania w szklarniach zalecamy roztwór 0,3%.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com