



# Micromax®

## TE Mix

Upewnij się, że Twoim roślinom niczego nie zabraknie stosując Micromax®.

0 | 0 | 0 | TE  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O



## Gwarantowana analiza

| Tlenek                        |                             |        |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| N                             | Azot całkowity              | 0%     |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Pięciotlenek fosforu        | 0%     |
| K <sub>2</sub> O              | Tlenek potasu               | 0%     |
| B                             | Bor                         | 0.70%  |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (B)  | 0.70%  |
| Cu                            | Miedź                       | 0.500% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Cu) | 0.500% |
|                               | Miedź EDTA (Cu)             | 0.500% |
| Fe                            | Żelazo                      | 7.80%  |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Fe) | 7.80%  |
|                               | Żelazo EDTA (Fe)            | 5.40%  |
|                               | Żelazo DTPA (Fe)            | 2.40%  |
| Mn                            | Mangan                      | 2.60%  |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Mn) | 2.60%  |
|                               | Mangan EDTA (Mn)            | 2.60%  |
| Mo                            | Molibden                    | 0.320% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Mo) | 0.320% |
| Zn                            | Cynk                        | 1.300% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Zn) | 1.300% |
|                               | Cynk EDTA (Zn)              | 1.300% |

## Charakterystyka

## Opis

Ta mieszanka mikroelementów jest klasą samą w sobie: zawiera wszystkie najważniejsze pierwiastki, jakie mogą się przydać. Trudne warunki lub niesprzyjająca pogoda często mogą oznaczać utratę składników odżywczych, ale nie w tym przypadku — wszystkie pierwiastki kationowe występują w formie chelatowej, dzięki czemu są do 5 razy lepiej przyswajane przez rośliny. Starannie opracowana kompozycja niezbędnych pierwiastków śladowych broni przed niedoborami oraz stymuluje rozwój korzeni i zdrowy wzrost. Micromax® WS TE zawiera również X3, biostymulant, który poprawia wchłanianie i pobieranie składników odżywczych. A do tego jest w 100% rozpuszczalny w wodzie, co pozwala na szybkie i proste przygotowanie.

## Korzyści

- \\ Zrównoważona formuła niezbędnych pierwiastków śladowych
- \\ Silniejsze korzenie sprzyjają zdrowemu wzrostowi
- \\ Umożliwia szybkie pobieranie składników odżywczych

## Sposób stosowania

- 1 MicroMax® WS TE to produkt klasy premium, który może być łatwo i bezpiecznie stosowany w uprawach rolniczych i ogrodniczych.
- 2 Chociaż główną metodą aplikacji jest fertygacja, może być również stosowany w formie oprysku dolistnego.
- 3 Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym, wentylowanym miejscu.
- 4 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

## Dawki

### Zalecane dawki

|                                  |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwiaty i warzywa                 | Zapobiegawczo: stosować 1-2 kg/ha we wczesnym okresie po założeniu rozsady, w fazie 4-6 liści.                                                                                              |
|                                  | Naprawczo: Rozpocząć przy pierwszych objawach niedoboru TE, stosując 1-2 kg/ha, oraz 2 dodatkowe opryski w odstępach 2-3 tygodniowych.                                                      |
| Owoce, drzewa i krzewy liściaste | Zapobiegawczo: stosować 3-6 kg/ha wczesną wiosną, gdy drzewa mają wystarczająco dużo liści, aby wchłonąć oprysk.                                                                            |
|                                  | Naprawczo: rozpocząć w momencie zawiązania owoców stosując 3-6 kg/ha.<br>Obserwować objawy niedoboru TE i natychmiast reagować stosując 2-3 dodatkowe opryski w odstępach 2-3 tygodniowych. |

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

## Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.