



## Sportsmaster® Base

### Fairway

Zadbaj o fantastyczny wygląd trawy

12 | 6 | 9 | 16.0 | 2.0  
N P2O5 K2O CaO MgO



## Gwarantowana analiza

| Tlenek |                                       |       |
|--------|---------------------------------------|-------|
| N      | Azot całkowity                        | 12%   |
|        | Azot amoniakalny (N-NH <sub>4</sub> ) | 1.4%  |
|        | Azot mocznikowy (N-Urea)              | 10.6% |
| P2O5   | Pięciotlenek fosforu                  | 6%    |
|        | Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)         | 5.7%  |
| K2O    | Tlenek potasu                         | 9%    |
|        | Rozpuszczalny w wodzie (K2O)          | 9.0%  |
| CaO    | Tlenek wapnia                         | 16.0% |
|        | Rozpuszczalny w wodzie (CaO)          | 4.0%  |
| MgO    | Tlenek magnezu                        | 2.0%  |
|        | Rozpuszczalny w wodzie (MgO)          | 2.0%  |

## Opis

Nawóz Sportsmaster® Base Fairway utrzymuje trawnik w idealnym stanie wiosną i latem, kiedy trawa intensywnie rośnie. Zawarty w składzie wapń sprawia, że komórki roślinne są bardziej odporne, a trawa staje się wytrzymała. Dodatkowo magnez przyspiesza fotosyntezę i wydobywa wspaniały kolor. Ponadto produkt uzupełnia wszelkie składniki odżywcze utracone na skutek koszenia, w tym azot i fosfor.

## Korzyści

- \\ Idealny nawóz w okresie intensywnego wzrostu wiosną i latem
- \\ Wapń wzmacnia komórki roślinne i hartuje trawę
- \\ Magnez poprawia fotosyntezę i podkreśla intensywny kolor

## Sposób stosowania

- 1 Stosować na suchą trawę od marca do sierpnia.
- 2 Nawadnianie pomaga w rozprowadzaniu nawozu i minimalizuje ryzyko jego usunięcia przez kosiarkę.
- 3 Nawodnić po 1–2 dniach, jeśli nie wystąpiły opady deszczu.
- 4 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy. Aby zapewnić prawidłowe rozproszenie granulek, przed koszeniem lub stryżeniem odczekać 3 dni.
- 5 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

## Zalecany okres stosowania

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Dawki

---

Zalecana dawka: 35-50 g/m<sup>2</sup>

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

## Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

---

ICL Growing Solutions [marketing.int@icl-group.com](mailto:marketing.int@icl-group.com)

