



Osmocote[®]
5

3-4M

Krótkoterminowy wzrost, długofalowe wyniki

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

oxide		
N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.8%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	0%
	Azot organiczny	0%
P2O5	Pięćciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	6.0%
K2O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	12.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	0.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.015%
	Miedź EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Żelazo	0.30%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.30%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.30%
	Żelazo DTPA (Fe)	0%
	Żelazo EDDHA (Fe)	0%
Mo	Molibden	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.012%
	Cynk EDTA (Zn)	0.012%

Opis

Działaj z wyprzedzeniem, stosując najnowszą technologię kontrolowanego uwalniania składników odżywczych – Osmocote[®] 5. Zapewnij swoim roślinom wydajne, bezpieczne i stałe dokarmianie z pomocą nowego nawozu 5. generacji o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych. Nawóz, którego skład został opracowany dla typów roślin o niedługim, 3–4-miesięcznym cyklu wegetacyjnym. Z pomocą technologii NutriMatch-Release dostarczy Twoim roślinom krótko, ale skutecznie działające dawki azotu, fosforu i potasu (NPK).

Korzyści

- \\ Bujniejszy wzrost, lepsze zdrowie i wybarwienie dzięki technologii OTEA
- \\ Charakterystyczne czerwone zabarwienie granulek pozwala rozpoznać 3–4 miesięczny czas działania
- \\ Najbardziej efektywne uwalnianie składników odżywczych

Sposób stosowania

- 1 Wymieszaj produkt z podłożem, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek.
- 2 Nie stosuj 3-4M do zaprawiania dołków.
- 3 W razie zastosowania produktu Micromax® Premium w dawce przekraczającej 200 g/m³ podłoża i połączenia z nawozem Osmocote® 5 skontaktuj się z doradcą technicznym ICL, aby uzyskać dokładne zalecenia.
- 4 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®. Aby uzyskać szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL Specialty Fertilizers.
- 5 Temperatura może wpływać na czas działania Osmocote® 5 3-4M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 4–5 mies. 21°C: 3–4 mies. 26°C: 2–3 mies.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 7 Przechowywać w suchym miejscu.

Dawki

	Przeciętne wymagania pokarmowe	Duże wymagania pokarmowe	Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie)
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	1-1.5 g/l	2-2.5 g/l	1 g/l
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod gołym niebem)	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	2 g/l
Rośliny doniczkowe	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	2 g/l
Rośliny rabatowe / balkonowe	2-3 g/l	3-3.5 g/l	2 g/l

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m³. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnych roślin, skonsultuj się z doradcą ICL. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Skontaktuj się z doradcą ICL, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.