



Osmocote[®] 5

| 8-9M

Wczesna wiosna, wczesny wzrost

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.8%
P2O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O ₅)	6.0%
K2O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	12.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	0.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.015%
	Miedź EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Żelazo	0.30%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.30%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.012%
	Cynk EDTA (Zn)	0.012%

Opis

Zadbaj o potrzeby wszystkich swoich wczesnowiosennych nasadzeń z 5 generacją nawozu Osmocote 5 o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych. Zagwarantuj stałe, bezpieczne i skuteczne odżywianie swoich roślin przez 8 do 9 miesięcy. Zoptymalizuj dostępność i pobór mikroelementów dzięki systemowi OTEA, który zapewni Twoim roślinom najlepsze wybarwienie, wzrost i zdrowie.

Korzyści

- Technologia NutriMatch-Release zapewnia lepsze i bardziej precyzyjne odżywianie
- Gwarantowana jakość produktu, każdy worek jest identyczny
- Najbardziej efektywne uwalnianie składników odżywczych

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmocote® 5 8-9M przede wszystkim do upraw kontenerowych, roślin wieloletnich oraz różnego rodzaju doniczkowych upraw o krótkim cyklu produkcyjnym.
- 2 Wymieszaj produkt bezpośrednio z podłożem, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek.
- 3 Możesz stosować Osmocote® 5 punktowo w glebie. Aby uzyskać dodatkowe porady, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.
- 4 W razie zastosowania produktu Micromax Premium w dawce przekraczającej 200 g/m³ podłoża i połączenia z nawozem Osmocote® 5, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL, aby uzyskać szczegółowe zalecenia.
- 5 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®. Aby uzyskać szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.
- 6 Temperatura może wpływać na czas działania Osmocote® 5 8-9M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 10–11 mies. 21°C: 8–9 mies. 26°C: 6–7 mies.
- 7 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 8 Przechowywać w suchym miejscu.

Dawki

	Przeciętne wymagania pokarmowe	Duże wymagania pokarmowe	Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie)
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	3.5-4.5 g/l	4-4.5 g/l	2-3 g/l
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod gołym niebem)	4.5-5.5 g/l	5.5-6.5 g/l	3-4 g/l
Rośliny doniczkowe	4.5-5.5 g/l	5.5-6.5 g/l	3-4 g/l

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m³. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnych roślin, należy skonsultować się z doradcą ICL. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.