



Osmocote[®] 5

5 5-6M

Pięciogwiazdkowy wzrost w ciągu pięciu miesięcy

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.8%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O ₅)	6.0%
K2O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	12.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	0.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.015%
	Miedź EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Żelazo	0.30%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.30%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.012%
	Cynk EDTA (Zn)	0.012%

Opis

Przejmij pełną kontrolę nad swoim późnowiosennym sadzeniem z pomocą technologii kontrolowanego uwalniania składników Osmocote[®] Pro 5-6M. Piąta generacja nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników zapewnia roślinom stałe, bezpieczne i skuteczne odżywianie przez 5 do 6 miesięcy. Uzyskaj maksymalnie zdrowe i dorodne rośliny o nasasyconych barwach, optymalizując dostępność i pobór mikroelementów dzięki systemowi OTEA.

Korzyści

- \\ Zapewnia lepsze, bardziej precyzyjne odżywianie dzięki technologii NutriMatch-Release
- \\ Oferuje największą skuteczność uwalniania składników odżywczych
- \\ Gwarantowana jakość produktu, każdy worek jest identyczny

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmocote® 5 5-6M do upraw kontenerowych o krótkim cyklu produkcyjnym, roślin wieloletnich oraz różnego rodzaju roślin doniczkowych.
- 2 Wymieszaj produkt z podłożem, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek.
- 3 Możesz stosować Osmocote® 5 punktowo wgłębnie. Aby uzyskać dodatkowe porady, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.
- 4 Skontaktuj się z nami, jeśli został zastosowany produkt Micromax Premium w dawce przekraczającej 200 g/m³ podłoża i połączony z nawozem Osmocote® 5.
- 5 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®.
- 6 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® 5 5-6M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 5–7 mies. 21°C: 5–6 mies. 26°C: 4–5 mies.
- 7 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 8 Przechowywać w suchym miejscu.

Dawki

	Przeciętne wymagania pokarmowe	Duże wymagania pokarmowe	Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie)
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	2-2.5 g/l	3-4 g/l	2 g/l
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	3-3.5 g/l	4-5 g/l	2-3 g/l
Rośliny doniczkowe	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l
Rośliny rabatowe/balkonowe	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m³. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.