



Osmocote® 5

12-14M

Zapewnij swoim roślinom odpowiednie odżywianie przez cały rok

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.1%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.7%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	12.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	0.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.015%
	Miedź EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Żelazo	0.30%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.30%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.010%
Zn	Cynk	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.012%
	Cynk EDTA (Zn)	0.012%

Opis

Wyprzedzaj trendy, stosując najnowszą technologię kontrolowanego uwalniania składników Osmocote® 5. Ten nawóz 5. generacji o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych gwarantuje stałe, skuteczne i bezpieczne odżywianie Twoich roślin. Stosując ten nawóz, którego czas działania wynosi 12–14 miesięcy, możesz mieć pewność, że Twoje rośliny będą otrzymywać potrzebny im pokarm przez co najmniej rok od wczesnowiosennego lub zimowego sadzenia w doniczkach.

Korzyści

- Technologia w systemie OTEA zapewnia optymalny wzrost, zdrowie i wybarwienie
- Technologia NutriMatch-Release gwarantuje lepsze przyswajanie składników odżywczych
- Charakterystyczne żółte zabarwienie pozwala rozpoznać 12–14 miesięczny czas działania

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmocote® 5 12-14M do upraw kontenerowych o krótkim cyklu produkcyjnym, roślin wieloletnich oraz różnego rodzaju roślin doniczkowych.
- 2 Dodaj produkt do podłoża, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek. Możesz też stosować Osmocote® 5 punktowo wgłębnie.
- 3 Skontaktuj się z ICL, jeśli został zastosowany produkt Micromax Premium w dawce przekraczającej 200 g/m³ podłoża i połączony z nawozem Osmocote® 5.
- 4 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®. Aby uzyskać szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.
- 5 Temperatura może wpływać na czas działania Osmocote® 5 12-14M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 15–17 mies. 21°C: 12–14 mies. 26°C: 9–11 mies.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 7 Przechowywać w suchym miejscu.

Dawki

	Przeciętne wymagania pokarmowe	Duże wymagania pokarmowe	Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie)
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	4-5 g/l	5-6 g/l	3-4 g/l
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod gołym niebem)	5-6 g/l	6-7 g/l	4-5 g/l
Rośliny doniczkowe	5-6 g/l	6-7 g/l	4-5 g/l

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m³. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnych roślin, skonsultuj się z doradcą ICL. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Skontaktuj się z doradcą ICL, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.