



Agroleaf[®] Liquid

High K

Potas w płynie o trójkierunkowym działaniu do ciągłego odżywiania roślin

8 | 8 | 16 | TE
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	8%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	8%
K ₂ O	Tlenek potasu	16%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	16%
B	Bor	0.020%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.020%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.060%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.030%
	Mangan EDTA (Mn)	0.030%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.015%
	Cynk EDTA (Zn)	0.015%

Opis

Agroleaf[®] Liquid High K to wysokiej jakości płynny nawóz dolistny, który zapobiega niedoborom potasu i koryguje je. Jest wzbogacony pakietem chelatowanych pierwiastków śladowych. Agroleaf[®] Liquid High K zawiera unikalną technologię F3 SurfActive, opracowaną przez ICL, która zwiększa efektywność każdej aplikacji dolistnej na trzy sposoby, zapewniając lepsze rozprowadzanie, przyleganie i retencję. Technologia F3 obniża napięcie powierzchniowe kropli. Składniki odżywcze mogą być wtedy lepiej rozprowadzone na liściach, co skutkuje większą powierzchnią pokrytą i lepszym pobieraniem składników odżywczych. Mniej składników odżywczych będzie spływać lub odbijać się od woskowatych liści, co zapewni lepszą retencję składników odżywczych. Technologia F3 pomaga również w tworzeniu małych osadów składników odżywczych na powierzchni liści, które są ponownie aktywowane po ponownym zwilżeniu; zapobiega to parowaniu, co przedłuża okres odżywiania dla lepszej aplikacji dolistnej.

Korzyści

- \\ Koryguje i zapobiega niedoborom potasu, aby zredukować stres abiotyczny.
- \\ Wzbogacony w schelatowane pierwiastki śladowe
- \\ Lepsze rozprowadzanie, przyleganie i retencja

Sposób stosowania

1

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecenia dotyczące upraw	Dawka litr/ha	Ilość wody litr/ha	Stęż. (%)	Czas
Warzywa owocowe, ogólnie	5-10	300-600	1.7	Zawiązanie owoców – zbiór 4-5 razy
Salaty, kapustne	3-5	300-600	1	Po uformowaniu głowy 2-3 razy
Cebula, czosnek	3-6	300-600	1	Przy powiększeniu cebulki 1-2 razy
Owoce miękkie, sady, winnice	5-10	600-1000	0.8-1	Zawiązanie owoców – 2 tygodnie przed zbiorem 4-5 razy
Ziemniaki	3-6	250-300	1.2-2	Wzrost bulwy 2-3 razy
Słonecznik	3-6	200-300	1.5-2	Początek kwitnienia
Rzepak	3-6	200-300	1.5-2	Początek kwitnienia
Rośliny ozdobne	2-3	600-1000	0.3	Przed i po kwitnieniu 1-2 razy

*Należy stosować niższe dawki przy mniejszej ilości wody/ha, a wyższe przy zwiększeniu ilości wody. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.