



Zn

Wyeliminuj niedobór cynku dzięki temu rozpuszczalnemu w wodzie nawozowi



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	0%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	0%
K2O	Tlenek potasu	0%
Zn	Cynk	14.000%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	14.000%
	Cynk EDTA (Zn)	14.000%

Charakterystyka

Opis

Agroleaf® Special Zn to najwyższej jakości nawóz dolistny, który zapobiega i kontroluje niedobór cynku. Nadaje się do wielu upraw, w tym zbóż, warzyw, kwiatów i drzew owocowych. Ponadto jest w pełni rozpuszczalny w wodzie, co czyni go popularnym wyborem w rolnictwie i ogrodnictwie. Zawiera szczególny aminokwas znany jako X₃ Active, który wspomaga uprawy w szybkim wchłanianiu Special Zn. Dzięki temu w ciągu zaledwie dwóch dni zmniejsza się stres abiotyczny spowodowany niedoborem cynku. Przygotowanie roztworu jest proste, a pełne rozpuszczenie następuje błyskawicznie. Do produkcji Agroleafu® Special Zn, który zawiera najwyższe w swojej klasie stężenie związku aktywnego, wykorzystujemy tylko najlepsze surowce i najnowsze technologie. Special Zn można również mieszać z innymi nawozami i środkami ochrony roślin, co pozwala zaoszczędzić czas na polu.

Korzyści

- \\ Korygowanie niedoboru Zn
- \\ Szybkie i skuteczne wchłanianie w celu zwalczania stresu abiotycznego
- \\ Poprawia metabolizm roślin

Sposób stosowania

- 1 Najlepszą porą na opryski jest późne popołudnie lub wieczór. Unikać oprysku w niekorzystnych warunkach (na przykład uprawy poddane działaniu wody, niska wilgotność względna powietrza, wysoka temperatura lub jeśli w ciągu 3 dni spodziewane są opady deszczu). W przypadku wystąpienia opadów deszczu w ciągu 4 godzin od oprysku, ponowić oprysk 3 lub 4 dni później.
- 2 Przetestuj produkt w końcowym stężeniu na małej powierzchni kilku roślin, tydzień przed właściwym opryskiem właściwym. Sprawdź wyniki kilka dni później.
- 3 Tak samo należy postępować szczególnie w przypadku mieszania w zbiorniku z innymi substancjami.
- 4 Należy stosować opryskiwacz wysokociśnieniowy wyposażony w dysze wytwarzające bardzo drobne krople.
- 5 Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy jego pojemności; uruchomić mechanizm mieszania. Całą ilość przeznaczonego preparatu Agroleaf® Special Zn wsypać do zbiornika i odczekać do całkowitego rozpuszczenia. Do zbiornika włożyć całą przewidzianą ilość środków grzybobójczych i/lub owadobójczych. Upewnić się, że pH wynosi od 4 do 6,5; w razie potrzeby skorygować dodając bardzo małe ilości Nova® PeKacid.
- 6 Napełnić zbiornik opryskiwacza do pełna. Natychmiast rozpocząć opryskiwanie i nie przestawać, aż zbiornik będzie pusty. Nie należy przechowywać roztworu do oprysku przez noc.
- 7 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.



Dawki

Średnia zalecana dawka dla wszystkich upraw wynosi od 0,2 do 0,3%.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

