



## Ferti-K

Potas najwyższej klasy

0 | 0 | 61  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O



## Gwarantowana analiza

Tlenek

|                               |                                           |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| N                             | Azot całkowity                            | 0%    |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Pięciotlenek fosforu                      | 0%    |
| K <sub>2</sub> O              | Tlenek potasu                             | 61%   |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (K <sub>2</sub> O) | 61.0% |

## Charakterystyka

## Opis

Nova Ferti-K® 0-0-61 jest doskonałym źródłem potasu. Jest niezbędny, aby pomóc owocom i warzywom nabrać masy, poprawić kolor, słodycz i zawartość oleju. Pomaga również poprawić gospodarkę wodną, dzięki czemu rośliny łatwiej radzą sobie ze stresem abiotycznym. Bogaty w chlorki, które pomagają kontrolować ciśnienie osmotyczne wewnątrz komórek roślinnych i regulować mechanizm zamykania szpar liściowych. Idealny do fertygacji na otwartej przestrzeni z wodą o EC poniżej 0,6 mS/cm. Ponadto jest w pełni i szybko rozpuszczalny. Odpowiedni szczególnie do upraw odpornych na chlorki, takich jak burak cukrowy, seler, zboża i kukurydza.

## Korzyści

- \\ Atrakcyjne cenowo źródło potasu
- \\ Optymalny dla upraw odpornych na chlorki
- \\ Łatwo rozpuszczalny: idealny do fertygacji

## Sposób stosowania

- 1 Nova Ferti-K® może być stosowany do każdego systemu fertygacji. Dzięki wysokiej zawartości potasu produkt ten może być stosowany we wszystkich fazach wzrostu, ale przede wszystkim po zawiązaniu owoców aż do zbiorów.
- 2 Produkt nie zawiera azotu, dzięki czemu jest odpowiedni przy dojrzewaniu owoców.
- 3 Nova Ferti-K® jest zalecany dla wszystkich upraw odpornych na chlorki.
- 4 Można go również stosować w uprawach częściowo wrażliwych, łącząc dwa źródła potasu, takie jak Nova SOP lub Nova N-K, aby zaspokoić potrzeby roślin przy jednoczesnym obniżeniu kosztów nawożenia.
- 5 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

## Dawki

---

Zalecany stopień rozcieńczenia dla roztworów podstawowych: 10–20 kg / 100 l wody

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

## Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

---

ICL Growing Solutions [marketing.int@icl-group.com](mailto:marketing.int@icl-group.com)

