



Quick-Mg

Quick-Mg, szybkie działanie

0 | 0 | 15 | 13.0
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	0%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	0%
K2O	Tlenek potasu	15%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	15.0%
MgO	Tlenek magnezu	13.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	13.0%

Charakterystyka

Opis

Nova Quick-Mg 0-0-15+13MgO to nasza unikalna formuła potasu i magnezu: idealna dla upraw, które najbardziej potrzebują tych mikroelementów, takich jak buraki cukrowe, ziemniaki, trzcina cukrowa i inne. Nie trzeba długo czekać, aby zauważyć różnicę w swoich roślinach: Wysoka zawartość magnezu w Quick-Mg w formie szybko wchłanianej sprawi, że w krótkim czasie będą one pełne chlorofilu. Liczy się wysoka czystość mikroelementów i niska zawartość sodu. Idealny do fertygacji dzięki wysokiej rozpuszczalności 680 g/l wody (w 20 °C).

Korzyści

- \\ Bogate źródło wapnia i potasu
- \\ Szybka absorpcja dla szybkiej reakcji
- \\ Łatwo się rozpuszcza

Sposób stosowania

- 1 Ponieważ Nova Quick-Mg jest kompatybilna z większością innych nawozów (azot, potas, wapń, a w szczególnych sytuacjach fosfor), może służyć jako jeden z elementów składowych programów odżywiania mineralnego większości upraw.
- 2 Zdecydowanie zalecane jest np. stosowanie go jednocześnie z Nova Ferti-K, w stosunku 1:1,2 (w/w) Nova Quick-Mg:Nova Ferti-K.
- 3 Taka mieszanka ma korzystną proporcję 6,7:1 w/w K+:Mg+2, co odzwierciedla idealny stosunek tych kationów w komórkach roślin. Wyraźnie wyższy udział K może znacznie ograniczyć pobieranie Mg przez korzenie roślin.
- 4 Na zastosowanie Nova Quick-Mg w dużym stopniu mogą reagować następujące uprawy: lucerna, koniczyna, drobne zboża, kukurydza, burak cukrowy, pasze, brokuły, kapusta, kalafior, seler, ogórek, bakłażan, papryka, ziemniak, dynia, szpinak, kabaczek, pomidor, borówka, drzewa iglaste.
- 5 Sytuacje, w których należy dokładnie sprawdzić lub unikać stosowania Nova Quick-Mg: warunki zasolenia, wysoka przewodność elektryczna (EC) wody do nawadniania lub roztworu glebowego. Uprawy wrażliwe na zasolenie i/lub chlorki, takie jak truskawka, cebula, marchew, koper włoski, rzodkiewka, sałata, wiele gatunków kwiatów, tytoń.
- 6 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecany stopień rozcieńczenia dla roztworów podstawowych: 10–15 kg / 100 l

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

