



Solinure[®] GT

5

Pomaga roślinom dobrze przetrwać zimę.

20 | 20 | 20 | TE
N P₂O₅ K₂O

5

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	20%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	5.9%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	3.8%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	10.3%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	20.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	20.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.04%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.002%
	Cynk EDTA (Zn)	0.002%

Charakterystyka

Opis

Aby uzyskać wszechstronny efekt odżywczy, wystarczy sięgnąć po nawóz do fertygacji Solinure[®] GT 5. Dzięki zrównoważonej formule NPK ten niezawodny nawóz jest idealnym rozwiązaniem wspomagającym rośliny w szklarniach i tunelach w wymagających fazach wzrostu i dojrzewania, a także doskonale nadaje się do wspierania upraw w trudnych zimowych okresach produkcji. Przy tak małej ilości mocznika, jak to tylko możliwe i całkowicie bez chlorków, Twoje rośliny z pewnością skorzystają z zestawu chelatowanych pierwiastków śladowych i dodatku magnezu.

Korzyści

- \\ Zrównoważona formuła NPK
- \\ Wysoka niezawodność
- \\ Przeznaczony do stosowania w fazie wzrostu i dojrzewania

Sposób stosowania

- 1 Solinure® GT 5 należy stosować fazie wzrostu i dojrzewania.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Uprawy:

Dawka

Uprawy polowe i obszary chronione oraz warzywa:

40-60 kg/ha na tydzień

Uprawy jagód, drzewa, owoce miękkie i pestkowe:

30-50 kg/ha na tydzień

Zalecana dawka: Stosować 4-5 kg/1000 m² tygodniowo. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

