



Solinure® GT

8

Daj swoim uprawom to, co najlepsze

23 | 10 | 10 | 5.6 | TE
N P2O5 K2O MgO

8

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	23%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	1.0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.2%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	20.8%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	10.0%
K2O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	5.6%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	5.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.04%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.002%
	Cynk EDTA (Zn)	0.002%

Charakterystyka

Opis

Nie idź na kompromis, jeśli chodzi o potrzeby odżywcze Twoich roślin spragnionych azotu – po prostu wybierz nawóz do fertygacji Solinure® GT 8. Dzięki wysokiej zawartości azotu w NPK ta wysoce niezawodna formuła jest najlepszym wyborem w fazie wegetatywnej upraw w szklarniach i tunelach. Ten bezchlorkowy produkt zawiera dodatek magnezu, co wraz z pełnym zestawem mikroelementów oferuje roślinom zoptymalizowaną formułę, która promuje wszechstronny zdrowy wzrost.

Korzyści

- \\ Całkowicie wolny chlorków
- \\ Wspomaga rośliny w wegetatywnej fazie wzrostu
- \\ Zawiera pełny zestaw pierwiastków śladowych

Sposób stosowania

- 1 Stosować Solinure® GT 8 w wegetatywnych fazach wzrostu roślin.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Uprawy:

Dawka

Uprawy polowe i obszary chronione oraz warzywa:

40-60 kg/ha na tydzień

Uprawy jagód, drzewa, owoce miękkie i pestkowe:

30-50 kg/ha na tydzień

Zalecana dawka: Stosować 4-5 kg/1000 m² tygodniowo. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

