



Solinure® GT

3

Wydobądź pełnię korzyści z upraw owocowych stosując Solinure® GT 3

12 | 5 | 35 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

3

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	12%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	8.1%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.1%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	1.8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	35%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	35.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.04%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.002%
	Cynk EDTA (Zn)	0.002%

Charakterystyka

Opis

Wykorzystaj w pełni możliwości systemu tunelowego i szklarniowych upraw owocowych dzięki nawozowi do fertygacji Solinure® GT 3. Dzięki formule NPK z niską zawartością azotu i wysoką zawartością potasu, jest to idealne rozwiązanie w fazie wzrostu i dojrzewania owoców, jak również w okresie produkcji zimowej. Ten wysoce niezawodny produkt, zawierający dodatek magnezu oraz zestaw w pełni schelatowanych mikroelementów, jest wolny od niepożądanych chlorków i mocznika, dostarczając roślinom tylko to, czego rzeczywiście potrzebują.

Korzyści

- \\ Pomoc w ciemnych, chłodnych miesiącach zimowych
- \\ Nie zawiera mocznika i chlorków
- \\ Zawiera magnez i pełny zestaw pierwiastków śladowych

Sposób stosowania

- 1 Solinure® GT 3 należy stosować w fazie wzrostu i dojrzewania owoców oraz w produkcji roślin ozimych.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Uprawy:	Dawka
Uprawy polowe i obszary chronione oraz warzywa:	40-60 kg/ha na tydzień
Uprawy jagód, drzewa, owoce miękkie i pestkowe:	30-50 kg/ha na tydzień

Zalecana dawka: Stosować 4-5 kg/1000 m² tygodniowo. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.